

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA



**Diabetes Mellitus Tipo 2 como factor de riesgo para
miomatosis uterina en pacientes del hospital III EsSalud -
Chimbote, 2016-2017**

Tesis para obtener el Título Profesional de Médico Cirujano

Autor

Vega Rumiche, Manuel Jesus

Chimbote – Perú
2018

ABSTRACT

Objetivo: Determinar si la diabetes mellitus tipo 2 es factor de riesgo para miomatosis uterina en pacientes del Hospital III Essalud - Chimbote. Material y Métodos: Se llevó a cabo un estudio de tipo analítico, observacional, retrospectivo, de casos y controles. La población de estudio estuvo constituida por 302 mujeres mayores de 18 años; las cuales fueron divididas en 2 grupos: con miomatosis uterina o sin ella; se calculó el Odds ratio y la prueba chi cuadrado. Resultados: No se apreciaron diferencias significativas en relación a las variables edad, grado de paridad, procedencia entre las mujeres mayores de 18; con o sin miomatosis uterina. La frecuencia de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con y sin miomatosis uterina fue 20% y 9% respectivamente. La diabetes mellitus tipo 2 es factor de riesgo para miomatosis uterina con un Odds ratio de 2.63 el cual fue significativo ($p < 0.05$). Conclusiones: La diabetes mellitus tipo 2 es factor de riesgo para miomatosis uterina en pacientes del Hospital III Essalud - Chimbote