

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ENFERMERÍA



**FACTORES ASOCIADOS Y ABANDONO DE LOS MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES DE EDAD FÉRTIL,
HOSPITAL BARRANCA 2024.**

**Informe de Tesis para Obtener el Título Profesional de Segunda
Especialidad de Enfermería en Gineco Obstétrica.**

Autor:

Lobatón Espinoza de Avila, Antonia Isabel

Asesor(a) – código ORCID

Palomino Márquez, Manuel Guzmán

Código ORCID. 0000-0002-7578-7544

Chimbote – Perú

2024

Índice general

	Pág.
Índice general	ii
Índice de tablas	iv
Índice de figuras	v
Palabras clave	vi
Constancia de originalidad	vii
Título	viii
Resumen	ix
Abstract	x
Introducción	1
Antecedentes y fundamentación científica	10
Justificación de la investigación	15
Problema	16
Conceptualización y operacionalización de las variables	17
Hipótesis	18
Objetivos	18
Metodología	18
Tipo y Diseño de investigación	18
Población - Muestra	19
Técnicas e instrumentos de investigación	20
Procesamiento y análisis de la información	22
Resultados	23
Análisis y Discusión	29
Conclusiones	32
Recomendaciones	33
Agradecimiento	34
Referencias bibliográficas	35

Anexos y apéndices	40
Matriz de operacionalización de variables	40
Matriz de consistencia	42
Instrumentos de recolección de datos	43
Validez y confiabilidad	46
Base de datos	52
Consentimiento informado	53
Solicitud a la institución donde se va desarrollar la investigación	55
Resultados generales	57
Repositorio institucional digital	61
Reporte de similitud	62

Índice de tablas

N°	Descripción	Pág.
Tabla 1	Determinar la relación entre los factores asociados con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024	23
Tabla 2	Identificar la relación entre los factores personales con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barrancas 2024	24
Tabla 3	Identificar la relación entre los factores socioculturales con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024	26
Tabla 4	Identificar la relación entre los factores institucionales con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024	27

Índice de figuras

N°	Figura	Pág.
Figura 1	Determinar la relación entre los factores asociados con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024	57
Figura 2	Identificar la relación entre los factores personales con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024	58
Figura 3	Identificar la relación entre los factores socioculturales con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024	59
Figura 4	Identificar la relación entre los factores institucionales con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024	60

Palabras clave

Tema	Factores asociados, abandono de métodos anticonceptivos
Especialidad	Enfermería

keyword

Topic	Associated factors, abandonment of contraceptive methods
Specialty	Nursing

Línea de Investigación

Línea de investigación	Salud sexual y reproductiva de la mujer, familia y comunidad
Área	Ciencias Médicas y de Salud
Sub área	Ciencias de la Salud
Disciplina	Ciencias socio biomédicas

Constancia de originalidad



CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD

El que suscribe, Vicerrector de Investigación de la Universidad San Pedro:

HACE CONSTAR

Que, de la revisión del trabajo titulado "FACTORES ASOCIADOS Y ABANDONO DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES DE EDAD FÉRTIL, HOSPITAL BARRANCA 2024." del (a) estudiante: **LOBATON ESPINOZA DE AVILA ANTONIA ISABEL**, identificado(a) con Código N° **2008114005**, se ha verificado un porcentaje de similitud del **29%**, el cual se encuentra dentro del parámetro establecido por la Universidad San Pedro mediante resolución de Consejo Universitario N° 5037-2019-USP/CU para la obtención de grados y títulos académicos de pre y posgrado, así como proyectos de investigación anual Docente.

Se expide la presente constancia para los fines pertinentes.

Chimbote, 26 de diciembre de 2024

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Dr. JAVIER MARTÍNEZ CARRIÓN
VICERRECTOR



NOTA: Este documento carece de valor si no tiene adjunta el reporte del Software TURNITIN.

FACTORES ASOCIADOS Y ABANDONO DE LOS METODOS
ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES DE EDAD FERTIL, HOSPITAL BARRANCA
2024

ASSOCIATED FACTORS AND CONTRACEPTIVE METHOD ABANDONMENT
IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE, HOSPITAL BARRANCA 2024

RESUMEN

El estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los factores asociados con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, la metodología utilizada fue, aplicada, descriptivo correlacional, de diseño no experimental, transversal, en una población muestral de 115 usuarias mujeres de edad fértil, el instrumento utilizado fue un cuestionario validado por juicio de expertos, los resultados, muestran una asociación entre los factores personales, puesto que el factor edad obtuvo un valor $p = 0.03 < 0.05$ y el nivel de educación un valor $p = 0.02 < 0.05$, asimismo, según los factores socioculturales como la influencia familiar, se identificó un valor $p = 0.01 < 0.05$ comprobándose que existe relación, además, la relación entre los factores institucionales, se encontró asociación en el conocimiento del personal de salud con un valor $p = 0.01 < 0.05$, se concluye que, existe relación significativa entre los factores personales, socioculturales e institucionales con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.

ABSTRACT

The objective of the research study was to determine the relationship between the factors associated with the abandonment of contraceptive methods in women of childbearing age, the methodology used was, applied, descriptive correlational, non-experimental, cross-sectional design, in a sample population of 115 female users of fertile age, the instrument used was a questionnaire validated by expert judgment, the results show an association between personal factors, since the age factor obtained a value $p = 0.03 < 0.05$ and the level of education a value $p = 0.02 < 0.05$, likewise, according to sociocultural factors such as family influence, a value $p = 0.01 < 0.05$ was identified, proving that there is a relationship. In addition, the relationship between institutional factors, an association was found in the knowledge of health personnel with a p value = $0.01 < 0.05$, it is concluded that there is a significant relationship between personal, sociocultural and institutional factors with the abandonment of contraceptive methods in women of childbearing age, Hospital Barranca 2024

Introducción

los anticonceptivos son métodos o técnicas que nos permiten reducir o evitar la fecundación en las mujeres y también a sus parejas, además de evitar un embarazo no planificado, además algunos métodos anticonceptivos nos protegen de las enfermedades de transmisión sexual (NTS de Planificación Familiar N° 124 - MINSA, 2016, p. 16), los factores asociados desempeñan un papel importante en los cambios de los sucesos, tiene la responsabilidad de controlar y cambiar las características de las personas, se clasifican en factores personales, factores socioculturales y los factores institucionales, el abandono de los métodos anticonceptivos es considerado como el acto de suspender o interrumpir el uso del anticonceptivo, pueden ser por los efectos secundarios, insatisfacción en la atención recibida por el profesional de salud, mitos y creencias o por decisiones propias de la usuaria (Romani y León, 2023, p. 23-25), en el Perú, 9 jóvenes de 15 a 19 años cada hora se embarazan y solo 5 de ellas llegan a ser madres, para el año 2023 las muertes maternas en menores de 17 años fueron del 8%, en comparación del 2021 de 5.1% y en el 2022 de 6%, el embarazo precoz puede afectar la vida de las niñas y adolescentes, abandono escolar, desempleo, pobreza y el acceso restringido a la asistencia de salud, incluso ocasionar la muerte de la niña, cuando el embarazo es por abuso sexual se incrementa la probabilidad del suicidio (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2024, párr. 1-3), al profesional de Enfermería se recomienda, implementar estrategias reflexivas y creativas en fortalecer las capacidades de todo el equipo profesional de salud, de los diferentes niveles de atención sanitaria, para una mejorar calidad de atención integral al paciente, en la toma decisiones sobre su vida sexual y reproductiva, la prevención de infecciones de transmisión sexual, relacionados con el abandono de los métodos anticonceptivos. El abandono de los anticonceptivos puede conllevar a embarazo no deseado y terminar en aborto provocado, tal situación puede generar complicaciones que ponen en riesgo la vida, por ello, se realizó un estudio de investigación referente a los factores asociados y abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca, se ejecutó la búsqueda de datos bibliográficos a través de asistencia electrónica en la elaboración del fundamento científico, determinación de las variables,

sus dimensiones y sus indicadores, nombrando antecedentes internacionales, nacionales y locales con mayor similitud y trascendencia, entre los antecedentes internacionales hemos considerando el trabajo realizado en México, por Delgadillo, Casaubón y Bocanegra (2023) desarrollan una investigación con el objetivo de analizar las principales causas de abandono de métodos de planificación familiar en mujeres en edad fértil, usaron una metodología observacional, analítico, prospectivo, transversal, de diseño no experimental, en una muestra de 380 participantes, los resultados evidenciaron que, en total el 96.40% de participantes usaron anticonceptivos de planificación familiar, de las cuales el 89.50% abandonaron su uso, los motivos fueron: el deseo de tener un hijo 40.2%, presentar efectos adversos 31.3% y el acceso al anticonceptivo 6.7%, además, los anticonceptivos con mayor incidencia de abandono tenemos: las pastillas anticonceptivas el 35.9%, los parches con 20.8% y el dispositivo intrauterino 15.8%, de acuerdo con los estudios el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos del 95.9% de participantes es alto, concluyeron que, las principales motivos de abandono del anticonceptivo es el deseo de tener un hijo, los efectos secundarios que presento y el escaso acceso a los anticonceptivos, los métodos con más incidencia de abandono fueron las pastillas, los parches y el DIU, además presentaron un nivel de conocimiento alto sobre anticonceptivos.

En Ecuador, Velásquez (2022) desarrolla una investigación con el objetivo de determinar los factores que influyen en la no utilización de métodos anticonceptivos en las mujeres en edad fértil, uso una metodología cualitativa, descriptiva, transversal, de diseño no experimental, como muestra 26 artículos seleccionados, sus resultados evidenciaron que, los motivos por las cuales no utilizaron los métodos anticonceptivos están relacionados con la cultura, la religión, por vergüenza, el temor hacia la pareja, los efectos adversos, el costo, la ineffectividad del método, desconocimiento en el uso y también la desconfianza al personal de salud, entre los anticonceptivos con mayor uso destacan las inyecciones, las pastillas de emergencia y los implantes, concluyó que, los factores más influyentes para no continuar con el uso de los métodos anticonceptivos fueron presentar algún efecto secundario, sentir vergüenza, su religión, el miedo a la pareja

y su cultura además, los métodos anticonceptivos con menos uso fueron: la esterilización quirúrgica, los preservativos femeninos y las pastillas anticonceptivas.

En Ecuador, Daza (2021) desarrolla una investigación con el objetivo para determinar la relación entre los factores asociados y el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértiles, uso una metodología cuantitativa, descriptiva, analítica, de casos y controles, retrospectivo, de diseño no experimental, una muestra con 120 participantes mujeres, sus resultados evidenciaron que, en el factor institucional 94.4% de las mujeres que no usan anticonceptivos manifestaron que el profesional de salud no confirmó si la información brindada sobre anticonceptivos se halla comprendido, mientras que 5.6% de las usuarias que utilizaron anticonceptivos, demostrando asociación entre los casos y controles, en el factor social como la edad se identificó que el 58.5% de las usuarias que no utilizan anticonceptivos, tenían de 15 a 25 años, igualmente que las usuarias que si utilizan anticonceptivos, demostrando asociación entre los casos y los controles, en el factor cultural; el 15% de las usuarias que no usan anticonceptivos creen que producen esterilidad, de igual manera el 71.7% de usuarias que si utilizan anticonceptivos, confirmando asociación entre los casos y controles, concluyó que, se relacionan al abandono de los anticonceptivos; en el factor institucional: el profesional de salud no corrobora si la paciente entendió la información brindada, en el factor social: la edad y en el factor cultural: las creencias de que los anticonceptivos causan esterilidad.

Entre los antecedentes nacionales se ha considerado el trabajo realizado en Huancayo, Romaní y León (2024) desarrollan una investigación, el objetivo fue determinar los factores relacionados al abandono del método anticonceptivo hormonal en mujeres, usaron una metodología, cualitativa, descriptiva, correlacional, prospectiva, transversal, el diseño no experimental, con una muestra de 148 usuarias, sus resultados evidenciaron que, el factor personal son indecisas 38.7% y se asocian al abandono del anticonceptivo con una correlación baja, en el factor sociocultural; son indecisas por su religión, grado de instrucción, influencia de la pareja y los amigos 40.6%, el factor clínico; el aumento de peso, dolores de cabeza, cambio de ánimo, alteración del sangrado y dolor menstrual, teniendo una correlación baja, en el factor institucional; las mujeres

abandonaron el anticonceptivo por el horario, el ambiente, el tiempo de espera, la disponibilidad del método y la atención que brinda el personal de salud 48.1%, aunque la correlación también es baja, concluyeron que, los factores personales, socioculturales, clínicos e institucionales presentan una correlación baja al abandono de los método anticonceptivo hormonal en las mujeres.

En Lima, Cruz (2023) desarrolla una investigación, el objetivo fue determinar los factores asociados al abandono de anticonceptivos hormonales en mujeres en edad fértil, uso una metodología cualitativa, observacional, analítica, prospectivo, transversal, diseño no experimental, la muestra de 100 mujeres, los resultados evidenciaron que, los factores asociados en el abandono del método anticonceptivo hormonal como: el nivel educativo, la distancia del establecimiento de salud, los eventos adversos presentados durante el uso del anticonceptivo, además que el personal de salud no identificara la necesidad de anticoncepción, el único factor asociado independiente fue haber presentado un evento adverso, concluyó que, los factores personales se asocian en presentar efectos adversos, en los factores socioculturales no se evidencio asociación, en los factores institucionales se asocian en la distancia y la falta de capacidad del personal de salud de poder identificar la necesidad de la usuaria sobre el métodos anticonceptivos hormonales.

En Puno, Quispe (2023) desarrolla una investigación, el objetivo fue determinar los factores asociados en el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres, empleo la metodología cuantitativa, correlacional, transversal, de diseño no experimental, la muestra fue 197 mujeres, los resultados evidenciaron que, los factores que tuvieron un gran impacto del 58% de las mujeres que abandonaron el métodos anticonceptivos, el 57 % de las mujeres fueron influenciadas por los factores institucionales, el 62% en los factores socioculturales y el 65% en el factores personales, concluyó que, se determinó una asociación muy significativa entre los factores institucionales, socioculturales y personales con el abandono de los métodos anticonceptivos.

En Lima, Quispe (2023) desarrolla una investigación, el objetivo fue determinar los factores asociados al abandono de los métodos anticonceptivos hormonales en

estudiantes, se empleó la metodología cuantitativa, observacional, analítico, transversal, de diseño no experimental, la muestra fue 218 alumnas, los resultados evidenciaron que, el factor personal asociado con el abandono de los métodos anticonceptivo hormonal fue cursar el último año académico, el factor sexual y reproductivo; tiempo de uso del anticonceptivo, los efectos secundarios, finalizar la relación sexual, en los factores sociodemográficos: la distancia, no contar con los medios económicos y accesibilidad por la pandemia, los factores socioculturales como: la influencia de la familia, concluyó que, se determinó una relación entre los factores personales, factores sociodemográficos, factores socioculturales, factores sexuales y reproductivos, con el abandono de los métodos anticonceptivos hormonales en los estudiantes.

En Lima, Girón y Gregorio (2022) desarrollaron una investigación, el objetivo fue determinar la influencia de los factores asociados a la deserción de los métodos anticonceptivos hormonales, usaron una metodología observacional, cuantitativa, relacional, analítico, epidemiológico, retrospectivo, transversal, diseño no experimental, la muestra de 60 usuarias que abandonaron el uso del anticonceptivo hormonal y 60 usuarias que continuaron utilizando el método anticonceptivo, los resultados evidenciaron que, los factores personales tenemos: el sangrado menstrual irregular, aumento del peso, cambios del estado de ánimo y sensibilidad en las mamas, influyeron en la interrupción de los anticonceptivos, de igual manera en los factores sociodemográficos; influyo el lugar de procedencia, en los factores sociales; destaco más la ocupación, concluyeron que, están relacionados con la deserción de los métodos anticonceptivos hormonales, los factores personales, sociodemográficos y sociales.

En Trujillo, Hernández (2022) desarrolla una investigación, el objetivo fue determinar que los factores personales, socioculturales e institucionales están asociados al abandono de los métodos anticonceptivos en las mujeres adolescentes, uso una metodología observacional, analítico, transversal, diseño no experimental, una muestra de 116 mujeres adolescentes, los resultados evidenciaron que, la incidencia de abandono de los anticonceptivos es 74.14%, las principales causas fueron no tener pareja sexual, la cantidad de hijos, los abortos, también hace referencia la mala calidad de atención,

concluyó que, los factores personales no están asociados al abandono de los métodos anticonceptivos, sin embargo los factores socioculturales e institucionales se encontró asociación de abandono como: influencia de la familia, la pareja y la mala calidad de la atención brindada por el establecimiento de salud.

En Lima, Sánchez y Pingo (2022) desarrollan una investigación con el objetivo de determinar la asociación entre los factores de abandono - no abandono y los métodos anticonceptivos de larga duración, usaron una metodología descriptivo, correlacional, retrospectivo, de diseño no experimental, la muestra de 140 usuarias, los resultados evidenciaron que, se presentó mayor asociación de abandono de los métodos anticonceptivos en las usuarias de 18 a 25 años, estado civil conviviente, grado de instrucción básica regular, de ocupación estudiante, además, el tipo de anticonceptivo con asociación de abandono fueron los implantes subdérmico y la ampolla trimestral, concluyeron que, los factores personales se evidencio asociación del implante subdérmico y la ampolla trimestral, en los factores socioculturales se evidencio asociación con la ampolla trimestral, sin embargo en los factores institucionales no hubo asociación, aunque se encontró relación con el implante subdérmico.

En Lima, Alvarado (2022) desarrolla una investigación, el objetivo fue determinar los factores asociados a la deserción del uso de métodos anticonceptivos durante la pandemia COVID-19, uso una metodología observacional, analítico, prospectivo, transversal, de diseño no experimental, la muestra de 241 usuarias, los resultados evidenciaron que, el 74.3% de las usuarias tenían de 18 a 34 años, las usuarias que abandonan el uso del anticonceptivo fue de 53.11%, los motivos fueron: poca comunicación con la familia referente al tema y el miedo a contraer la enfermedad COVID-19, concluyó que, los factores culturales y los factores institucionales se evidencio una asociación significativa en la deserción en el uso de los métodos anticonceptivos como: la poca comunicación con la familia y el miedo a enfermarse, por el contrario en los factores sociodemográficos y personales no se evidencio asociación de abandono durante el uso de los anticonceptivos.

En Juliaca, Flores y Escalante (2022) desarrollan una investigación, el objetivo fue determinar los factores de riesgo que influyen en el abandono de los métodos anticonceptivos, usaron la metodología cuantitativa, descriptivo, transversal, de diseño no experimental, una muestra de 109 usuarias, los resultados evidenciaron que, los factores institucionales: el 55% de las usuarias no tenían conocimiento del servicio de planificación familiar, en los factores socioculturales: el 33.0% de las usuarias están en desacuerdo que la información que brindan sobre los métodos anticonceptivos sea buena, en relación a los factores personales, el 35.8% de las usuarias están en desacuerdo que es suya la responsabilidad de su embarazo no planificado, concluyeron que, los factores de riesgo que influyen en el abandono de método anticonceptivo son los factores institucionales, socioculturales y personales.

En Lima, Tume y Vásquez (2021) desarrollan una investigación, el objetivo fue determinar los factores asociados al abandono de los métodos anticonceptivos en estudiantes femeninas, usaron una metodología cuantitativa, correlacional, transversal, de diseño no experimental, en una muestra 220 estudiantes femeninas, los resultados evidenciaron que, los factores personales; son estudiantes 63.2%, solteras 86.4% y sexualmente activas 83.6%, además, el motivo de abandono del anticonceptivo es olvidarse de la administración, en cuanto a los factores socioculturales tenemos; influencia de la pareja 35.5%, los amigos 24.1%, además, en los efectos secundarios presentan; aumento del peso y tener mucho sueño, con más frecuencia al abandono son las pastilla anticonceptiva combinada, el 57.7% abandonaron por no acudir al establecimiento de salud y el 55.0% por falta de accesibilidad, concluyeron que, los factores personales, socioculturales y los efectos secundarios se relacionan con el abandono de los métodos anticonceptivos.

En Breña, Pajares (2021) desarrolla una investigación con el objetivo de determinar los factores de riesgo que se asocian al abandono de los métodos anticonceptivos durante la pandemia, usó una metodología observacional, descriptivo, retrospectivo, transversal, diseño no experimental, la muestra de 225 usuarias entre 20 y 35 años, sus resultados evidenciaron que, el factor de nuliparidad obtuvo mayor asociación 48.8%, las usuarias

con cesáreas previas fueron relevantes en la investigación con un total 25%, además, los antecedentes patológicos por comorbilidades evidencian asociación de abandono de 10%, concluyó que, el factor de riesgo con mayor asociación de abandono de los métodos anticonceptivo durante la pandemia fueron en el factor obstétrico como: nuliparidad y cesárea anterior, en los factores personales: los antecedentes patológicos, sin embargo otros factores no evidenciaron ninguna asociación.

En Ayacucho, Rojas y Pariona (2021) desarrollaron una investigación, con el objetivo de determinar los factores asociados al abandono del método anticonceptivo hormonal, usaron una metodología aplicada, correlacional, de diseño no experimental y transversal, es una muestra conformada por 133 mujeres, los resultados evidenciaron el 27.8% las mujeres refieren abandonado del uso de los anticonceptivos hormonales, en el factor sociodemográfico asociado al abandono del método anticonceptivo fueron; el 13.5% multíparas y 12% fueron solteras, dentro de los factores clínicos el 19.5% presento cefalea, el 18.8% presento aumento del peso, los anticonceptivos hormonales con mayor incidencia de abandono fueron las píldoras anticonceptivas 10.5% y el implante subdérmico 9%, concluyeron que, los factores sociodemográficos y factores clínicos tenemos: la multiparidad, ser soltera, presentar cefalea, subir de peso, están asociados al abandono de los anticonceptivos hormonal.

En Piura, Gutiérrez (2021) desarrolla una investigación, con el objetivo de identificar los factores relacionados al abandono del uso de los métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil, empleo una metodología de tipo básica, cuantitativa, correlacional, transversal, de diseño no experimental, la muestra fue 170 mujeres, los resultados evidenciaron que, el 60% de las mujeres si abandonaron el método anticonceptivo, el 69.4% tenían conocimientos de planificación familiar, el 60.6% la calidad de atención, el 69.4% la distancia, el 64.7% la educación no influyo en su decisiones, el 84.7% influencia de la familia, el 77.6% la religión, el 81.2% la pareja no influyo en sus decisiones, el 51.8% tenía medios económicos, el 71.2% los mitos sobre los efectos no influyeron en sus decisiones, el 67.6% tenían criterios de autocuidado, el 74.7% no tenía vergüenza, el 67.1% no tenía temor de presentar malestar, el 63.5% si

tenía tiempo, concluyó que, en los factores institucionales se relacionaron al abandono de los métodos anticonceptivos: la calidad de atención, distancia al establecimiento de salud y al domicilio, en los factores socioculturales se relacionan: la religión y los recursos económicos, así mismo en los factores personales fueron: el autocuidado, el miedo a presentar algún malestar y la disponibilidad del tiempo.

En Lima, Colca (2021) desarrolla una investigación, el objetivo fue determinar los factores asociados al abandono de los métodos anticonceptivos hormonales, empleo una metodología cualitativo, observacional, descriptiva, analítico, de casos y controles, transversal, longitudinal, diseño no experimental, la muestra conformada de 32 artículos científicos, los resultados evidenciaron que, en los factores personales que influyen al abandono de los anticonceptivos hormonales fueron: la edad, los efectos secundarios, la cantidad de hijos, antecedentes patológicos, el nivel socioeconómico bajo y el nivel de conocimiento bajo, en los factor culturales influyen al abandono: la educación, su procedencia, el idioma, la ocupación, el trabajo y la lejanía del establecimiento de salud, en los factores sociales destaca: influencia de la pareja, por falta o una inadecuada información y la violencia de la pareja, concluyó que, los factores personales, culturales y sociales están asociados al abandono de los métodos anticonceptivos hormonales.

En Lima, Silva (2020) desarrolla una investigación, el objetivo fue identificar los factores asociados al abandono de métodos anticonceptivos en mujeres, uso la metodología observacional, analítico, de casos y controles, retrospectivo, de corte transversal, diseño no experimental, la muestra de 47 mujeres que abandonaron el uso del anticonceptivo y 94 mujeres que no abandonaron el uso del anticonceptivo, resultados evidenciaron que, el 36.2% de las mujeres abandonaron su uso, el factor multiparidad evidencio mayor asociación al abandono 35.2%, los antecedentes patológicos se evidencio mayor riesgo de abandono 29.8%, los factores reproductivos no evidenciaron asociación, concluyó que, los factores personales que se asocian al abandono de los métodos anticonceptivos fueron: los antecedente patológicos, la multiparidad, edad extrema, sin embargo, el factor reproductivo no evidencia asociación de abandono de los métodos anticonceptivos.

La elaboración de la fundamentación científica se sustenta de la base teórica conceptual y operacional, caracterizado por las variables a través de sus dimensiones e indicadores planteadas, para su estudio de investigación se ha iniciado desarrollando la variable factores asociados, según Romaní y León (2023) considera un factor asociado a la contribución y el desempeño de un papel importante en cambios de los sucesos, además tiene la responsabilidad del control o la variación de las características de las personas, se clasifican en factores personales: son situaciones que cumplen un rol en la elección de no continuar con la atención del servicio de planificación familiar, entre ellas tenemos: edad, estado civil, nivel educativo, situación laboral, el autocuidado, timidez, miedo, disponibilidad del tiempo y los antecedentes patológicos, los factores socioculturales: las características de las personas están vinculadas a los patrones culturales que son transmitidos de una generación a otra, la pareja, los amigos y parientes, así como la religión y sus creencias, sin embargo hay religiones que prohíben el uso de los anticonceptivos, los factores institucionales; se basan en los cuidados de los paciente, además se pueden tratar temas relacionados con la salud sexual y planificación familiar (p. 23-25), asimismo, el Ministerio de Educación - Perú (2022) la oficina de medición en la calidad del aprendizaje, establece que los factores asociados son un grupo de variables que nos permiten comprender y situar en un contexto los conocimientos adquiridos, además, el análisis de estas variables tiene como objetivo fomentar a la reflexión y el debate acerca de la situación educativa, teniendo en cuenta los diferentes entornos donde se desenvuelve la persona y puede influir de forma negativa o positivamente al desarrollo de sus habilidades (p. 3).

Según la Organización Mundial de la Salud (2021) define a los factores sociales de la salud como una situación donde los individuos nacen, se desarrollan, habitan y llegan a envejecer, incluyendo a un grupo más extenso de fuerzas y sistemas que afectan las condiciones de la vida diaria del individuo, estas estructuras e instituciones forman parte de las políticas y los sistemas económicos, los programas de desarrollo, las condiciones pueden variar según los distintos grupos de una población y pueden provocar variaciones en los resultados relacionados con la salud (párr. 1), de igual manera, para Buldón (2022)

los factores asociados también conocidos como determinantes de la salud se clasifican en factores personales, socioculturales e institucionales, que influyen en la salud de la población en general, diferentes modelos que se presentaron han intentado de explicar los mecanismos de cómo actúan los determinantes de salud y todos aceptan lo complejo de las interacciones que se presentan en las personas y el medio ambiente, de tal forma poder conservar la salud (párr. 1), según de la Guardia y Ruvalcaba (2020) mencionan que, los factores asociados, llamados también factores determinantes han tenido cambios históricos en la humanidad, comprenden desde el factor ambiental, biológicos, conductuales, sociales, económicos, laborales, culturales y la atención de la salud (p. 83), además Villar (2011) refiere que, los determinantes de la salud desde la perspectiva del sistema de salud, hace referencia a la investigación realizada por Lalonde, donde se establecieron cuatro determinantes clave para la salud, ya sea de forma personal o grupal, estos factores se clasifican en medio ambiente: está relacionado a los elementos físicos, biológicos, atmosférica y química, tales como el suelo, agua y aire, en el factor sociocultural y psicosocial: se vinculan con la vida cotidiana, los estilos de vida: se relaciona a la alimentación, el ejercicio, las adicciones, los comportamientos peligrosos, la actividad sexual, el uso de los servicios de salud, entre otros, la biología humana: está relacionado con la genética y la edad, la atención sanitaria o factores institucionales: hacen referencia a la calidad, la accesibilidad y el financiamiento de los servicios de salud (p. 239), desde el punto de vista de Tume y Vásquez (2021) menciona que, son situaciones específicas que aportan al origen de un suceso, el factor personal, se relacionan con las cualidades de la persona según: el estilo de vida, la ocupación y las características sociodemográficas, el factor sociocultural comprende: aspecto sociales y culturales de la persona, de su entorno, su organización, el grado o cargo que representa en la sociedad, las creencias, la religión, sus costumbres, entre otros, además influyen en su comportamiento y las decisiones que tomen, el factor efectos secundarios: hace mención al reaccionar del organismo durante el uso del método anticonceptivo y como consecuencia toma la decisión de abandonar su uso (p. 26).

La dimensión factores personales, según Romani y León (2023) sostiene que, son recursos que poseen la habilidad para manejar la situación y juegan un rol en la modificación de los sucesos, se considera que un factor contribuye al resultado, es el encargado al cambio o variación, considerado también como características propias de una persona como; edad, sexo, la identidad social, cultural, el sistema orgánico, su capacidad, entre otros aspectos (p. 23), además Colca (2021) menciona que, son cualidades de carácter individual, suelen abarcar diversas enfermedades que persona ha sufrido o la padece desde su niñez, se incluyen: edad, efectos secundarios, igualdad, embarazos, estatus social, económico, conocimiento, antecedente patológico e infecciones de transmisión sexual (p. 64).

La dimensión factores socioculturales, según Gutiérrez (2022) indica que, los factores socioculturales poseen un ambiente altamente fluctuante, los hombres han sido formados por un ejemplo social llamado machismo, transmitido de generación por la madre o el padre, esto se ha evidenciado indiscutiblemente en zonas de la selva y la sierra, en la selva el 40% de los mujeres refieren en la entrevista ambulatorio del establecimiento de salud que sus parejas quienes deciden que estrategia emplear como método anticonceptivo (p. 13), además, Tume y Vásquez (2021) hacen referencia del ámbito social y cultural de un individuo, dentro de su ambiente, considera el tipo de organización, el grado de autoridad otorgado a las instituciones o líderes de una comunidad, sus creencias, sus religiones, sus tradiciones y demás, que pueden afectar la selección de una determinada conducta o la toma de una decisión (p. 26).

La dimensión factores institucionales, según Cruz (2022) hace referencia a todo procedimiento relacionado con la atención de la salud que se brinda a la persona y comunidad en general en los diferentes niveles de atención que constituyen el sistema de atención sanitaria, este sistema es un relevante actor en los factores de salud, proporcionando los saberes y técnicas específicamente para la población y desde la sociedad en su totalidad, impulsando acciones que potencian la salud de la comunidad (p. 30), además, Romaní y León (2023) considera el establecimiento de salud donde se pueden tratar temas relacionados con la salud sexual y la organización familiar, además

necesita disponer de recursos para responder las condiciones de las normas técnicas de planificación familiar, con el objetivo de proporcionar a los usuarios que visiten el establecimiento de salud brindar información precisa, oportuna, completa y disponer de anticonceptivos en la institución (p. 23).

La variable abandono de los métodos anticonceptivos, empleando palabras de Delgadillo, Casaubon y Bocanegra (2023) refieren que, los métodos anticonceptivos poseen la capacidad de disminuir o prevenir las probabilidades de que se produzca un embarazo no deseado, pueden utilizarse en la primera interacción sexual y durante toda la vida sexual, el abandono del anticonceptivo del servicio de planificación familiar puede surgir debido a que se presente algún efecto secundario, errores o fallas del método, el anhelo de tener un hijo, por alguna enfermedad que padezca, por factores económicos, otros factores (párr. 1), asimismo, Romani y León (2023) Considera a todo proceso que suspende o interrumpe el uso de alguno métodos anticonceptivos, por la insatisfacción de la atención brindada en el establecimiento de salud, presentar efectos secundarios durante el uso, relacionarlo con algún mito, las creencias o por decisiones propia de la persona (p. 25), según Colca (2021) hace mención que, el abandono de los anticonceptivos están relacionadas al conjunto de factores que alteran su proceso, así como el factor personal que son de carácter individual como; edad, efectos secundarios, embarazos, cantidad de hijos, nivel social, medios económico, antecedentes de enfermedad, el factor culturales; se considera las características demográficos, característica social, el grado de instrucción, el idioma, la ocupación, la religión, los mitos y creencias, el factor social, por lo general influyen directamente o indirectamente en el abandono de los anticonceptivos, entre ellas tenemos: la influencia de la pareja, la familia, personal de salud, las amistades y las redes sociales (p. 64, 65), además, Barrera, Olvera, Castelo y Cancelo (2020) establecen que, todo elemento que interfiere o altera el desarrollo de un proceso ya sea bueno o malo al abandono del método anticonceptivo, se relaciona con diversos factores como: los efectos adversos, deseo de tener un hijo, fallas del método, cambio de método, tener alguna enfermedad, problemas personales, problemas económicos, de las cuales se pueden agrupar en los métodos que prescribió el doctor y las que origina la paciente (p. 89).

Según la Organización Mundial de la Salud (2019) refieren que, dos tercios de mujeres retrasaron o limitaron a ser madres, ellas dejaron de usar el anticonceptivo por temor a los efectos secundarios, problemas de salud o porque subestimaron la posibilidad de embarazarse, lo que generó de cada cuatro embarazos uno sea no planificado, del total 85% de las féminas abandonaron el uso del anticonceptivo, por el cual quedaron embarazadas en el primer año y tuvieron que finalizar el embarazo con un aborto, otras de las causas se debieron a que tuvieron problemas de salud (párr. 1, 2).

De acuerdo con la Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar N.º 124 - MINSA (2016) los métodos anticonceptivos previenen o reducen la fecundación en mujeres de edad reproductivas, también de parejas que lo usan, pero se deben cumplir con las características que permitan alcanzar sus objetivos reproductivos de forma segura y efectiva según el entorno de vida que la rodean, además, son ofrecidos gratuitamente en todos los establecimientos públicos del país, entre ellos mencionaremos los siguientes: los métodos anticonceptivos temporales tenemos; la abstinencia periódica, consisten en reconocer los signos y síntomas relacionados con los periodos fisiológicos de fertilidad conformado por el método del ritmo, método de Billings o moco cervical, los días fijos o método del collar y la lactancia materna exclusiva y amenorrea, los métodos de barrera; tales como el preservativo masculino, preservativos femenino y los espermicidas, los métodos hormonales; tenemos las píldoras anticonceptivas o anticonceptivo oral combinado, los inyectables mensuales y trimestrales, el Parche hormonal combinado, los implantes subdérmicos, el Anillo vaginal, los dispositivos intrauterinos (DIU) o T de cobre, los métodos definitivos tenemos; la anticoncepción quirúrgica femenina; el bloqueo tubárico bilateral (BTB) y la anticoncepción quirúrgico masculino o vasectomía, los métodos de anticoncepción de emergencia; se usan como una alternativa y solo en situaciones de emergencia, después de tener relaciones sexuales sin usar protección, posterior al abuso sexual o por la ruptura del preservativo y de esa manera poder evitar un embarazo no planificado o deseado (p. 16, 48, 89).

La investigación se respalda en la teoría de Enfermería de Mac Lalonde, se sustenta en el modelo de los factores determinantes de la salud, fue publicado en el Informe Lalonde, donde hace mención de nuevas perspectivas de la salud, además, De la Guardia (2024) menciona que, es un modelo proporcionó un modelo académico en los últimos años, agrupa y detalla los diversos factores y condiciones que inciden al abandono de la salud, también de los métodos anticonceptivos, este modelo está conformado por cuatro factores determinantes de la salud, entre ellas tenemos: la biología humana, los estilos de vida, el medio ambiente y el sistema sanitario, se entiende en el esquema de Lalonde que los factores relacionados con la biología humana comprenden: la carga genética, su desarrollo, el envejecimiento, entre otros, son escasamente alterables y que la intervención pública se enfocaría en los demás factores, la atención que brinda el sistema de salud, es muy importante su contribución en considerar al sistema sanitario como un factor específico muy distinto a los demás factores, sin embargo esta estructura conceptual resalta la importancia de la respuesta intersectorial y superar las desigualdades que se suscitan al momento de brindar la asistencia de forma personal o en pareja (párr. 1- 4).

La justificación de la investigación nos permite sustentar los motivos por las cuales damos inicio al respectivo estadio de forma teórico, práctico, metodológico, científico y social, la justificación teórica; aporta conocimientos conceptuales que favorecerán al incremento de nuevos conocimientos y la implementación de nuevas estrategias que van a permitir identificar los factores asociados al abandono de los métodos anticonceptivos como un problema de salud pública, desde la profesión de enfermería contribuir a mejorar el estado físico, mental y prevenir las enfermedades de transmisión sexual, brindar los conocimientos, la accesibilidad y disposición a los métodos anticonceptivos, justificación práctica; busca identificar de manera clara y objetiva las debilidades y problemáticas presentadas al momento de brindar los servicios en el establecimiento de salud, además coordinar con todo el equipo multidisciplinario de salud, tener aliados sociales dentro de la comunidad que permitan mejor control y monitoreo de la efectividad del uso adecuado de los métodos anticonceptivos, justificación metodológica; nos permite la elaboración de nuevas estrategias y habilidades de largo y corto plazo que nos permitan mejorar la calidad

de la atención, mejorar aspectos relacionados a los factores asociados con el abandono de los anticonceptivos, la metodología de estudio empleado es aplicada, descriptivo, correlacional, prospectivo, de corte transversal, de diseño no experimental, justificación científica; van a demostrar nuevas evidencias científicas que van a permitir a los estudiantes ser fuente de consulta para futuros estudios de investigación donde la implicancia, las variables y los escenarios puedan ser diferentes al actual, buscar los patrones de conducta, poder explicar los motivos y los factores determinantes, observar, relacionar si los motivos y los factores señalados son verdaderos, de esa manera poder explicar ciertas conductas para evitarlas o corregirlas, justificación social; los resultados obtenidos van a permitir nuevos aportes a los futuros estudiantes, los profesionales de la salud, las familias y la comunidad en general sobre los factores asociados y el abandono de los métodos anticonceptivo, motivo que a generando en nuestro país problemas de salud pública, siendo uno de los principales motivos de pobreza en el mundo, los embarazos de adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, los abortos provocados, madres multíparas, complicaciones durante y después del parto e incluso la muerte de la madre- hijo durante el parto.

La elaboración de la descripción del problema se sustenta con la búsqueda internacional, nacionales y local de datos claros que proporcionen información para la investigación, según la Organización Mundial de la Salud, cada año 21 millones de mujeres de 15 a 19 años quedaron embarazadas en los países en desarrollo y 12 millones dan a luz, el 55% de los embarazos no planificados que terminaron en aborto, las madres menores de edad tuvieron mayor riesgo de eclampsia, endometritis e infecciones sistémicas, parto pretérmino e infección neonatal, el desconocimiento y bajos recursos económicos, motivos por los cuales influyeron al abandono de los métodos anticonceptivos (OMS, 2024, párr.1-5), de igual manera, en el Perú cada hora 9 jóvenes de 15 a 19 años salen embarazadas y solo 5 mujeres son madres, para el año 2023 las muertes maternas en menores de 17 años fueron del 8%, en comparación del 2021 de 5.1% y en el 2022 de 6%, el embarazo precoz puede afectar la vida de las niñas y adolescentes, abandono escolar, desempleo, pobreza y el acceso restringido a la asistencia sanitaria,

provocando daños hasta muerte de la niña, cuando el embarazo es por un abuso sexual se incrementa la probabilidad del suicidio (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2024, párr. 1-3), además la COVID-19 tuvo un impacto sobre el acceso a los anticonceptivos, a fines del 2020 la población pobre en nuestro país aumentó de 16.5% a 19.1%, unas 62 667 mujeres no pudieron comprar un método anticonceptivo y tuvieron que discontinuar su uso, niñas menores de 15 años que son obligadas a ser madres aumentó en 25%, mientras que las muertes maternas incrementaron en 63% y el número de parejas protegidas por los anticonceptivos en los servicios de salud del ministerio de salud se redujo en 23% para el 2021 (UNFPA, 2021, párr. 1, 3, 8), por lo expuesto formulo el problema ¿Cómo se relacionan los factores asociados con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024?.

La conceptualización y operacionalización de las variables de estudio se ha iniciado desarrollando la definición conceptual de los factores asociados: se considera un factor asociado a la contribución y desempeño de un papel importante en los cambios de los sucesos, tiene la responsabilidad del control o la variación de las características del individuo, se clasifican en los factores personales como; la edad, el estado civil, el nivel educativo, la ocupación, la cantidad de hijos, cantidad de abortos, la cantidad de parejas sexuales, edad de inicio de la relación sexual, los factores socioculturales; los individuos muestran una serie de características específicas vinculadas a patrones culturales que son transmitidos de una generación a otra, igualmente, los amigos y los parientes pueden ejercer influencia la toma de sus decisiones, así como la religión y las creencias ancestrales, los factores institucionales; consiste en temas relacionados al cuidado de la salud de los paciente en los diferentes establecimientos prestadores de servicios de salud, además tratar temas relacionados a la salud sexual y reproductiva (Romaní y León, 2023, p. 23-25).

Definición operacional de factores asociados; se medirá mediante la aplicación de un cuestionario validados por juicio de expertos, estructurado por el autor mediante 3 dimensiones tales como: factores personales, los factores socioculturales y los factores institucionales, conformada por 17 ítems, de escala nominal, definición conceptual del abandono de los métodos anticonceptivos; refiere que es todo elemento que participa en la

aparición de un suceso o tiende a afectar el desarrollo de un proceso de forma buena o mala, el abandono de los métodos anticonceptivos consiste en no continuar o no cumplir con el uso del anticonceptivo que pueden estar relacionados por las características propias del método, de la persona, la pareja, los factores internos, externos y los prestadores de los servicios de salud (Colca, 2021, p. 64, 65), definición operacional al abandono de los métodos anticonceptivos; se medirá mediante la aplicación del cuestionario validado por juicio de expertos, estructurados por el autor mediante 1 dimensión tal como: abandono de los métodos anticonceptivos, conformado por 1 ítems para completar los motivo de abandono del método anticonceptivo que uso por última vez, de escala nominal.

Hipótesis alterna: Si existe relación entre los factores asociados con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.

Hipótesis nula: No existe relación entre los factores asociados con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.

Objetivo General: Determinar la relación entre los factores asociados con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.

Objetivos Específicos: Identificar la relación entre los factores personales con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.

Identificar la relación entre los factores socioculturales con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.

Identificar la relación entre los factores institucionales con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.

Metodología: el tipo investigación que se empleará será observacional, sin intervención, tampoco se manipularán las variables de estudio por parte del investigador, además, la información obtenida durante la aplicación del instrumento se expresara tal como ocurrieron los hechos, para lograr los propósitos que el investigador (Manterola, Quiroz, Salazar y García, 2019), según su finalidad he formulando la investigación aplicada, cuya intención es solucionar el problema o imposición concreta, enfocándome en la exploración

de un nuevo discernimiento para su aplicación y uso en el perfeccionamiento científico para el fortalecimiento de la ciencia de enfermería (Arias y Covinos, 2020, p. 68), según su alcance he planteado la investigación descriptiva, correlacional, de diseño no experimental, prospectivo de corte transversal porque la recolección de la información será por única vez y en un tiempo determinado, cuya medida de datos derivados se procesaron según los objetivos formulados por el investigador (Arias y Covinos, 2020, p. 78, 79).

Diseño: $M = V1 \quad r \quad V2$

Donde:

M: Muestra censal. Paciente

V1: Factores asociados.

r: Relación de las dos variables

V2: Abandono de los métodos anticonceptivos

Se consideró una población muestra conformada por 115 mujeres en edad fértil, hospitalizadas en el servicio de Gineco Obstetricia del Hospital de Barranca, usuarias que abandonaron el uso de los métodos anticonceptivos y cumplieron los criterios de inclusión mencionadas por el investigador (La Real Academia Española, 2023, párr. 1) define población como un conjunto de personas que habitan en un determinado lugar, se empleó un muestreo probabilístico aleatorio simple de acuerdo a los intereses del investigador.

Donde:

N = Población o universo

$Z\alpha$ = Nivel de confianza

e = Error de estimación

p = Probabilidad a favor

q = Probabilidad en contra

n = Tamaño de la muestra

$$n = \frac{N \times Z\alpha^2 \times p \times q}{e^2 \times (N-1) + Z\alpha^2 \times p \times q}$$

$$n = \frac{164 \times 1.96^2 \times 0.50 \times 0.50}{0.05^2 (164-1) + 1.96^2 \times 0.50 \times 0.50} = 115.14$$

$$n = 115$$

los criterios de inclusión; mujeres en edad fértil de 15 a 49 años, mujeres que abandonaron el uso del anticonceptivos, ser pacientes en el servicio de hospitalización de Gineco Obstetricia, no tener problemas psiquiátricos u otro problema de comunicación, permitir su consentimiento de participar en la investigación, los criterios de exclusión; mujeres que no están en edad fértil, no ser paciente del servicio de hospitalización de Gineco Obstetricia, tener problemas psiquiátricos u otro problema de comunicación, no permitir el consentimiento de participar de la investigación.

Técnicas e instrumentos de investigación, la recolección de la información será de forma presencial, en la recolección de los datos haremos uso de la encuesta y el instrumento será un cuestionario que se aplicará a las usuarias hospitalizadas en el servicio de Gineco Obstetricia del Hospital de Barranca, se medirán las respuestas a través de una escala valoración de MD: muy en desacuerdo 1 punto, D: desacuerdo 2 puntos, I: indeciso 3 puntos, A: de acuerdo 4 puntos, MA: muy de acuerdo 5 puntos, según (Gama, 2016, p. 24, 25), elaboró un instrumento de preguntas seleccionadas con las dimensiones e indicadores de las definiciones específicas de sus variables en estudio.

Propongo elaborar un cuestionario conformado de dos partes, la primera parte lo conforman las variables factores asociados, la segunda parte conforma la variable abandono de los métodos anticonceptivos, la primera parte evalúa la variable factores asociados que está conformada por 3 dimensiones con un total de 17 ítems, la dimensión factores personales está conformada por 7 ítems, la dimensión factores socioculturales está conformada por 5 ítems y la dimensión factores institucionales está conformada por 5 ítems, se medirán a través de un puntaje de inicio el valor 1 según se marque la alternativa correspondiente y una escala de valoración de MD; muy en desacuerdo 1 punto, D; desacuerdo 2 puntos, I; indeciso 3 puntos, A; de acuerdo 4 puntos, MA; muy de

acuerdo 5 puntos, la segunda parte evalúa la variable abandono del método anticonceptivos que está conformada por 1 dimensión abandono del método anticonceptivo que consta de 1 ítems, para completar el motivo de abandono del método anticonceptivo, además seguiremos los procesos administrativos correspondiente, mantendremos en el anonimato la identidad del encuestador, solicitaré el permiso y autorización correspondiente del director general del Hospital de Barranca, el proceso de recolección de datos será de forma presencial durante el turno programado y tiempo determinado para la recolección de datos será de 20 minutos, previa orientación sobre el contenido del cuestionario al encuestador, la validez y confiabilidad se dio mediante el juicio de 3 jurados expertos profesionales de la salud.

Experto 1.

Apellidos y Nombres: Montañez Sulca Jaqueline Lorta

Profesión: Licenciada en Enfermería

Especialidad: Enfermería en Gineco Obstétrica

Grado académico: Mg. Gestión publica

Experto 2.

Apellidos y Nombres: Flores Méndez Maura Azucena

Profesión: Licenciada en Enfermería

Especialidad: Enfermería en Gineco Obstétrica

Grado académico: Mg. en Educación con mención en docencia del Nivel Superior.

Experto 3.

Apellidos y Nombres: Sánchez Trejo Norma Carmen

Profesión: Licenciada en Enfermería

Especialidad: Enfermería en Gineco Obstétrica

Procesamiento y análisis de información

Los resultados obtenidos de la investigación fueron observados de forma crítica propugnado en el paradigma científico deductivo cuantitativo asentando las ideas descriptivo correlacional, durante el proceso se proyectó el progreso según los puntajes asignados, con la finalidad de comprobar la hipótesis planeada en la investigación (Sánchez, Fernández y Díaz, 2021, p. 5, 6), para la elaboración del informe de tesis, se ha considerado las normas APA-6, y el protocolo metodológico de investigación 2023 de la Dirección General de Investigación de la Universidad San Pedro (Universidad San Pedro, 2023), los resultados obtenidos en la investigación se presentan en tablas y gráficos según los objetivos formulados, a un nivel de significancia del 95% y un margen de error del 5%, facilitan elaborar la conclusión general y las conclusiones específicas según los objetivos y plantearemos las recomendaciones del trabajo científico.

Resultados

Tabla 1

Determinar la relación entre los factores asociados con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.

Factores asociados	Abandono de los métodos anticonceptivos						Total		Chi cuadrado		
	Efecto secundario		Embarazo		Deseo de tener hijo						
	n	%	n	%	n	%	n	%	X ²	P. Valor	
Factores personales											
Edad	15 a 19	1	0.87	6	5.22	0	0.00	7	6.09	13.73	0.03
	20 a 29	22	19.13	15	13.04	11	9.57	48	41.74		
	30 a 39	13	11.30	17	14.78	17	14.78	47	40.87		
	40 a 49	4	3.48	3	2.61	6	5.22	13	11.30		
Total		40	34.78	41	35.65	34	29.57	115	100.00		
Nivel de Educación	Básico	28	24.35	20	17.39	11	9.57	59	51.30	11.74	0.02
	Técnico	7	6.09	14	12.17	12	10.43	33	28.70		
	Superior	5	4.35	7	6.09	11	9.57	23	20.00		
Total		40	34.78	41	35.65	34	29.57	115	100.00		
Factores socioculturales											
Influencia familiar	No	12	10.43	16	13.91	3	2.61	31	26.96	8.89	0.01
	Si	28	24.35	25	21.74	31	26.96	84	73.04		
Total		40	34.78	41	35.65	34	29.57	115	100.00		
Factores institucionales											
Conocimiento del personal de salud	No	10	8.70	17	14.78	3	2.61	30	26.09	10.30	0.01
	Si	30	26.09	24	20.87	31	26.96	85	73.91		
Total		40	34.78	41	35.65	34	29.57	115	100.00		

Fuente: Elaboración propia

La tabla 1 se observa que, los factores personales de la edad, el grupo de 20 a 29 años, con un total del 41.74%, el segundo grupo con mayor porcentaje de abandono se encuentra en el rango de 30 a 39 años, representan el 40.87% del total, en contraste, los grupos de edad más jóvenes de 15 a 19 años y los más mayores 40 a 49 años muestran menores tasas de abandono, con 6.09% y 11.30% respectivamente, en el nivel de educación se observa que, las mujeres con educación básica representan el grupo con mayor tasa de abandono 51.30%, con educación técnica y superior muestran tasas de abandono más bajas, 28.70% y 20.00% respectivamente, en los factores socioculturales se observa que, la influencia de la familia se concentra en mujeres que, si experimentan una influencia familiar significativa, representan el 73.04% del total, las mujeres que no experimentan una influencia familiar representan el 26.96% del total de abandonos, en los factores institucionales se observa que, las mujeres que consideran que el personal tiene conocimiento adecuado el 73.91% del total, las mujeres que consideran que el personal no tiene conocimiento adecuado representan el 26.09% del total, relacionado al abandono de los métodos anticonceptivos se presentan tres motivos principales para el abandono de dichos métodos, se evidencia el 35.65% por embarazo, el 34.78% por efectos secundarios y el 29.57% por el deseo de tener un hijo, en mujeres de edad fértil.

Tabla 2

Identificar la relación entre los factores personales con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.

Factores personales	Abandono de los métodos anticonceptivos						Total		Chi cuadrado	
	Efecto secundario		Embarazo		Deseo de tener hijo		n	%	X ²	P. Valor
	n	%	n	%	n	%				
Edad										
15 a 19	1	0.87	6	5.22	0	0.00	7	6.09	13.73	0.03
20 a 29	22	19.13	15	13.04	11	9.57	48	41.74		
30 a 39	13	11.30	17	14.78	17	14.78	47	40.87		
40 a 49	4	3.48	3	2.61	6	5.22	13	11.30		
Total	40	34.78	41	35.65	34	29.57	115	100.00		
Nivel de Educación										
Básico	28	24.35	20	17.39	11	9.57	59	51.30	11.74	0.02
Técnico	7	6.09	14	12.17	12	10.43	33	28.70		
Superior	5	4.35	7	6.09	11	9.57	23	20.00		
Total	40	34.78	41	35.65	34	29.57	115	100.00		
Estado civil										
Soltera	10	8.70	12	10.43	9	7.83	31	26.96	4.56	0.34
Conviviente	24	20.87	20	17.39	23	20.00	67	58.26		
Casada	6	5.22	9	7.83	2	1.74	17	14.78		
Total	40	34.78	41	35.65	34	29.57	115	100.00		
Cantidad de hijos										
Ninguno	7	6.09	9	7.83	9	7.83	25	21.74	1.71	0.79
1 a 2	25	21.74	21	18.26	18	15.65	64	55.65		
3 a más	8	6.96	11	9.57	7	6.09	26	22.61		
Total	40	34.78	41	35.65	34	29.57	115	100.00		
Número de aborto										
Ninguno	28	24.35	30	26.09	27	23.48	85	73.91	0.86	0.65
1 a 2 aborto	12	10.43	11	9.57	7	6.09	30	26.09		
Total	40	34.78	41	35.65	34	29.57	115	100.00		
Número de pareja sexual										
1 pareja	16	13.91	11	9.57	15	13.04	42	36.52	2.88	0.58
2 parejas	14	12.17	19	16.52	12	10.43	45	39.13		
3 a más	10	8.70	11	9.57	7	6.09	28	24.35		
Total	40	34.78	41	35.65	34	29.57	115	100.00		
Inicio de relación sexual										
Antes de 15 años	5	4.35	8	6.96	1	0.87	14	12.17	13.86	7.74
15 a 19 años	35	30.43	30	26.09	26	22.61	91	79.13		
20 a más	0	0.00	3	2.61	7	6.09	10	8.70		
Total	40	34.78	41	35.65	34	29.57	115	100.00		

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 2 se observa que, en la edad se concentra en el grupo de 20 a 29 años, con un total del 41.74%, el segundo grupo de 30 a 39 años, con el 40.87% del total, seguida de los grupos de edad mayores 40 a 49 años con el 11.30% y los más jóvenes 15 a 19 años con 6.09% del total, en la educación se puede observar que las mujeres con educación básica representan el grupo con mayor tasa de abandono 51.30%, seguida por el grupo de estudios de nivel técnico de 28.70% y en el grupo de estudio superior el 20.00%, en el estado civil se puede observar que, las mujeres convivientes representan el 58.26% del total de abandonos, las mujeres solteras el 26.96% y el grupo de mujeres casadas representan el 14.78% del total, en la cantidad de hijos se puede observar que, las mujeres con 1 a 2 hijos tienen la mayor tasa de abandono de 55.65%, las mujeres que tienen de 3 a más hijos el 22.61%, las mujeres sin hijos de 21.74% respectivamente, en el número de abortos podemos observar que, las mujeres que no han tenido aborto representan el 73.91% y las que han tenido entre 1 a 2 abortos representan el 26.09% del total, en el número de parejas sexuales podemos observar que, las mujeres con 2 parejas sexuales representan el 39.13% del total de abandonos, las mujeres con 1 pareja sexual el 36.52% de los abandonos, para las mujeres con 3 o más parejas sexuales constituyen el 24.35% del total, en inicio de la relación sexual se puede observar que, el grupo que inició su vida sexual entre los 15 a 19 años, representan el 79.13%, el grupo que inicio antes de los 15 años representan el 12.17%, el grupo de 20 años a más representan el 8.70% del total, relacionado al abandono de los métodos anticonceptivos, se evidencia que, el 35.65% es por embarazo, el 34.78% por los efectos secundarios y el deseo de tener hijo 29.57% en mujeres de edad fértil.

Tabla 3

Identificar la relación entre los factores socioculturales con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.

Factores socioculturales	Abandono de los métodos anticonceptivos						Total	Chi cuadrado			
	Efecto secundario		Embarazo		Deseo de tener hijo			n	%	X ²	P. Valor
	n	%	n	%	n	%					
Tipo de religión											
Católica	36	31.30	34	29.57	26	22.61	96	83.48	4.33	0.63	
Evangélica	2	1.74	2	1.74	1	0.87	5	4.35			
Cristiana	1	0.87	3	2.61	4	3.48	8	6.96			
Otros	1	0.87	2	1.74	3	2.61	6	5.22			
Total	40	34.78	41	35.65	34	29.57	115	100.00			
Ocupación											
Estudiante	5	4.35	7	6.09	4	3.48	16	13.91	1.27	0.97	
Ama de casa	21	18.26	22	19.13	18	15.65	61	53.04			
Profesional	4	3.48	4	3.48	5	4.35	13	11.30			
Otros	10	8.70	8	6.96	7	6.09	25	21.74			
Total	40	34.78	41	35.65	34	29.57	115	100.00			
Influencia familiar											
No	12	10.43	16	13.91	3	2.61	31	26.96	8.89	0.01	
Si	28	24.35	25	21.74	31	26.96	84	73.04			
Total	40	34.78	41	35.65	34	29.57	115	100.00			
Influencia de amistades											
No	28	24.35	29	25.22	25	21.74	82	71.30	0.12	0.94	
Si	12	10.43	12	10.43	9	7.83	33	28.70			
Total	40	34.78	41	35.65	34	29.57	115	100.00			
Influencia de la religión											
No	12	10.43	16	13.91	8	6.96	36	31.30	2.12	0.35	
Si	28	24.35	25	21.74	26	22.61	79	68.70			
Total	40	34.78	41	35.65	34	29.57	115	100.00			

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 3 se observa que, el tipo de religión la mayoría de los abandonos se concentran en mujeres que pertenecen a la religión católicas el 83.48%, las cristianas el 6.96%, otras religiones el 5.22%, las evangélicas el 4.35%, en ocupación observa que, las amas de casa representan el 53.04%, las mujeres con otras ocupaciones el 21.74%, el grupo de estudiantes el 13.91% y el grupo de mujeres profesionales el 11.30%, en influencia de la familia se puede observar que, la mayoría de los abandonos se concentran en mujeres que si experimentan una influencia familiar de 73.04% y las mujeres que no experimentan una influencia familiar el 26.96%, en influencia de las amistades se observa que, en mujeres que no experimentan una influencia significativa de sus amistades el 71.30% y las mujeres que experimentan una influencia de sus amistades representan el 28.70%, en influencia de la religión revela que, la mayoría de los abandonos se concentran en las mujeres que consideran la religión como un factor influyente representan el 68.70%, en el grupo de mujeres que no consideran la religión como un factor influyente, representa el 31.30%, relacionado al abandono de los métodos anticonceptivos, se evidencia que, 35.65% es por el embarazo, el 34.78% por los efectos secundarios y el 29.57% el deseo de tener hijo, en mujeres de edad fértil.

Tabla 4

Identificar la relación entre los factores institucionales con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024

Factores institucionales	Abandono de los métodos anticonceptivos						Total	Chi cuadrado	X ²	p_valor
	Efecto secundario		Embarazo		Deseo de tener hijo					
	n	%	n	%	n	%				
Conocimiento del servicio de Planificación familiar										
No	4	3.48	3	2.61	1	0.87	8	6.96	1.43	0.49
Si	36	31.30	38	33.04	33	28.70	107	93.04		
Total	40	34.78	41	35.65	34	29.57	115	100.00		
Métodos anticonceptivos gratuito										
No	7	6.09	4	3.48	1	0.87	12	10.43	4.20	0.12
Si	33	28.70	37	32.17	33	28.70	103	89.57		
Total	40	34.78	41	35.65	34	29.57	115	100.00		
Horario de atención										
No	16	13.91	15	13.04	10	8.70	41	35.65	0.92	0.63
Si	24	20.87	26	22.61	24	20.87	74	64.35		
Total	40	34.78	41	35.65	34	29.57	115	100.00		
Conocimiento del personal de salud										
No	10	8.70	17	14.78	3	2.61	30	26.09	10.30	0.01
Si	30	26.09	24	20.87	31	26.96	85	73.91		
Total	40	34.78	41	35.65	34	29.57	115	100.00		
Distancia de su casa al establecimiento de salud										
No	26	22.61	25	21.74	24	20.87	75	65.22	0.76	0.68
Si	14	12.17	16	13.91	10	8.70	40	34.78		
Total	40	34.78	41	35.65	34	29.57	115	100.00		

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 4 se observa que, en el conocimiento del servicio de Planificación familiar las mujeres que tienen acceso al servicio, representan el 93.04% del total, % y las mujeres sin conocimiento del servicio de planificación familiar representan el 6.96% del total de abandonos, en los métodos anticonceptivo gratuito se observa que, en las mujeres que tienen acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, representan el 89.57% y las mujeres sin acceso a métodos anticonceptivos gratuitos representan el 10.43%, en el horario de atención se observa que, en mujeres que tenían conocimiento de los horarios de atención de planificación familiar el 64.35% y las mujeres sin conocimiento del horarios de atención representan el 35.65%, en el conocimiento del personal de salud se observa que, las mujeres que consideran que el personal tiene conocimiento adecuado, representan el 73.91% y las mujeres que consideran que el personal no tiene conocimiento adecuado representan el 26.09% del total, en la distancia de su vivienda al establecimiento de salud se observa que, las mujeres que no consideran una barrera significativa en la distancia, representan el 65.22% y las mujeres que consideran una barrera significativa en la distancia es el 34.78%, relacionado al abandono de los métodos anticonceptivos, se puede evidenciar que, 35.65% es por el embarazo, el 34.78% por los efectos secundarios y el deseo de tener hijo representa el 29.57%, en las mujeres de edad fértil.

Prueba de hipótesis

H₁: Si existe relación entre los factores asociados con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.

H₀: No existe relación entre los factores asociados con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.

Regla de decisión

Se utilizó un nivel de significancia = 5%

Si el valor $p \geq 0.05$ aceptamos la hipótesis nula.

Si el valor $p < 0.05$ aceptamos la hipótesis alterna.

Tabla 5

Matriz de asociación de las variables factores asociados y abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024

Factores asociados	Abandono de los métodos anticonceptivos	
	Estadístico (X^2)	p-valor
Factores personales		
Edad	13.73	0.03
Nivel de educación	11.74	0.02
Factores socioculturales		
Influencia familiar	8.89	0.01
Factores institucionales		
Conocimiento del personal de salud	10.30	0.01

Fuente: Elaboración propia

La tabla 5 se evidencia la asociación significativa entre los factores personales y abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, puesto que el factor edad obtuvo un valor $p = 0.03 < 0.05$ y el nivel de educación un valor $p = 0.02 < 0.05$; asimismo, según los factores socioculturales como la influencia familiar, se identificó un valor $p = 0.01 < 0.05$ comprobándose que existe relación, además, la relación entre los factores institucionales de las usuarias y el abandono de métodos anticonceptivos, se encontró asociación en el conocimiento del personal de salud con un valor $p = 0.01 < 0.05$.

Análisis y Discusión

Los factores asociados para el Ministerio de Educación (2022) son un grupo de variables que ayudan a comprender los conocimientos adquiridos, en los distintos entornos donde se desenvuelve la persona y pueden influir positiva o negativamente en el desarrollo de sus habilidades, de acuerdo con Romaní y León (2023) los factores asociados contribuyen y desempeño de un papel importante en los cambios de los sucesos, la variación de las características de las personas y se clasifican en factores personales, factores socioculturales y los factores institucionales, los resultados muestran que, los factores asociados están relacionados al abandono de los métodos anticonceptivos, se identificó que existe relación entre los factores personales como la edad y nivel educativo como características de abandono, se identificó en los factores socioculturales como la influencia familiar, en los factores institucionales se identificó que si tenía conocimiento el personal de salud, relacionado al abandono de los métodos anticonceptivos debido al embarazo 35.65%, efectos secundarios 34.78% y por el deseo de tener hijos 29.57% del total, de igual manera, Quispe (2023) hace referencia que se determinó una asociación muy significativa entre los factores personales, los factores socioculturales y los factores institucionales con el abandono de los métodos anticonceptivos.

En los factores personales, según Romaní y León (2023) sostiene que, son recursos que poseen la habilidad para manejar la situación y desempeñan un rol significativo en la modificación de los sucesos, además considera que un factor contribuye a un resultado si es el responsable del cambio o la variación, los resultados muestran que, la relación de los factores personales con el abandono de los métodos anticonceptivos se concentran en el grupo con mayor tasa de abandono, en la edad de los grupos etéreos de 20 a 29 años de 41.74% y 30 a 39 años de 40.87%, las mujeres con educación básica de 41.74%, las mujeres convivientes 58.26%, mujeres con 1 a 2 hijos el 55.65% , las mujeres que no han tenido abortos 73.91%, han tenido 2 parejas sexuales 39.13%, han iniciado su relación sexual de 15 a 19 años 79.13% representan el grupo con mayor tasa de abandono

debido al embarazo 35.65%, efectos secundarios 34.78% y el deseo de tener hijos 29.57%, según Girón y Gregorio (2022) refieren que, los factores personales como: el sangrado menstrual irregular, aumento del peso, cambios del estado de ánimo y sensibilidad en las mamas, influyeron en la interrupción de los anticonceptivos, además Colca (2021) hace referencia que, influyen al abandono de los anticonceptivos los factores personales como: la edad, los efectos adversos, la cantidad de hijos, los antecedentes patológicos, el nivel socioeconómico bajo y el nivel de conocimiento bajo, de acuerdo con Silva (2020) hace referencia que, los factores personales que se asocian al abandono de los métodos anticonceptivos son; los antecedentes patológicos, la cantidad de hijos y la edad, además Time y Vásquez (2021) concluyen que, los factores personales asociados al abandono como: ser estudiantes, solteras y sexualmente activa, y el olvido de la administración del anticonceptivo, en los factores socioculturales como: influencia de la pareja y los amigos .

En los factores socioculturales, la Organización Mundial de la Salud (2021) define como un conjunto extenso de fuerzas y sistemas que afectan el estilo de la vida diaria de la persona, estas estructuras e instituciones comprenden sistemas políticos, sociales económicos y programas de desarrollo, las condiciones pueden variar significativamente para distintos subgrupos de una población y pueden presentar variaciones en los resultados relacionados con la salud. Según Tume y Vásquez (2021) hacen referencia del ámbito social y cultural de la persona, dentro de su ambiente, considerando su organización, el nivel de autoridad que representa en la institución o ser parte de un grupo de líderes, las creencias, la religión, sus tradiciones y demás, que influyen en el comportamiento y la toma de decisiones de la persona, los resultados muestran que, la relación de los factores socioculturales y abandono de los métodos anticonceptivos se concentran en las mujeres que pertenecen a la religión católicas 83.48%, de ocupación amas de casa 53.04%, si se evidencia la influencia de la familia 73.04%, no se evidencia influencia las amistades 71.30% y la influencia de la religión 68.70%, que representan el grupo con mayor tasa de abandono, debido al embarazo, efectos secundarios y por el

deseo de tener hijos, según Trujillo y Hernández (2022) hacen referencia que, los factores socioculturales como: influencia de la familia y de la pareja se demostró asociación de abandono, además en el factor institucional se encontró asociación de abandono por la mala calidad de la atención brindada por el establecimiento de salud.

En los factores institucionales, según Villar (2011) define a los determinantes de salud desde la perspectiva de la atención sanitaria o también determinados como factores institucionales, consiste en la calidad de atención que se brinda, la accesibilidad y el financiamiento de los servicios de salud, los resultados muestran que, la relación de los factores institucionales con el abandono de los métodos anticonceptivos se concentra el grupo con mayor tasa de abandono, en las mujeres que tienen acceso al servicio de planificación 93.04%, que tienen acceso a los métodos anticonceptivos gratuitos 89.57%, tienen acceso a los horarios del servicio de planificación familiar 64.35%, consideran que el personal tiene conocimiento adecuado 73.91%, mujeres que no perciben una barrera significativa en la distancia 65.22%, de acuerdo con Daza (2021) evidencio que, en el factor institucional el profesional de salud no corrobora si la paciente entendió la información brindada sobre los métodos anticonceptivos.

Según Gutiérrez (2021) evidencio que, los factores institucionales se relacionaron al abandono de los métodos anticonceptivos en la calidad de atención, distancia al establecimiento de salud y la distancia al domicilio, en los factores socioculturales: la religión y los recursos económicos, así mismo en los factores personales: el autocuidado, el miedo a los efectos secundarios y la disponibilidad de tiempo, Además, Cruz (2023) evidencio que, el factor personal se evidencio asociación en presentar efectos adversos, en los factores institucionales: la distancia y la falta capacidad del personal de salud de poder identificar la necesidad de la usuaria de anticonceptivos hormonales, sin embargo, no se evidencio asociación en los factores socioculturales.

Conclusiones

Se pudo determinar que, existe relación significativa entre algunos factores personales, factores socioculturales y factores institucionales con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.

Se llegó a identificar que, existe relación entre los factores personales como la edad y nivel educativo como características que predominaron el abandono de los métodos anticonceptivos a un margen de error del 5% y un nivel de confiabilidad del 95% en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.

llegó a identificar que, existe relación a un margen de error del 5% y un nivel de confiabilidad del 95% entre los factores socioculturales como la influencia familiar el cual fue motivo al abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.

Se llegó a identificar que, existe relación entre los factores institucionales como el conocimiento del personal de salud a un margen de error del 5% y un nivel de confiabilidad del 95% con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.

Recomendaciones

Se recomienda al director ejecutivo del Hospital de Barranca Cajatambo y SBS, implementar estrategias reflexivas y creativas en fortalecer las capacidades de todo el equipo profesional de la salud, en los diferentes niveles de atención, para mejorar la calidad de atención integral al paciente, en la toma decisiones por sí mismas sobre su vida sexual y reproductiva relacionado al abandono de los métodos anticonceptivos.

Se recomienda al jefe del departamento de Enfermería del Hospital de Barranca Cajatambo y SBS, organizar talleres de capacitación para fortalecer las capacidades del equipo profesional de enfermería del servicio de Gineco Obstetricia y jefes líderes de los diferentes servicios, con la finalidad de mejorar la calidad de atención integral al paciente, en la toma decisiones por sí mismas sobre su vida sexual y reproductiva relacionado al abandono de los métodos anticonceptivos.

Se recomienda a la jefa del servicio de Enfermería de Gineco Obstetricia del Hospital de Barranca Cajatambo y SBS, formar grupos de trabajos dirigidos por los líderes de grupos, a trabajar en equipo y coordinadamente con finalidad de mejorar la calidad de atención integral al paciente, en la toma decisiones por sí mismas sobre su vida sexual y reproductiva relacionado al abandono de los métodos anticonceptivos.

Se recomienda a los profesionales de enfermería del servicio de Gineco Obstetricia del Hospital de Barranca Cajatambo y SBS, cumplir con las estrategias y procesos de atención para mejorar la calidad de atención integral al paciente, en la toma decisiones por sí mismas sobre su vida sexual y reproductiva, una atención oportuna que disminuya los comportamientos de riesgo sexual relacionado al abandono de los métodos anticonceptivos.

Agradecimiento

Quiero agradecer de manera especial a toda mi familia, que de alguna manera me han apoyado, a mi esposo e hijos por todo su amor, su paciencia y su apoyo incondicional que me han brindado para lograr mis metas trazadas.

A mi asesor de tesis, Palomino Márquez Manuel Guzmán, expresar mi agradecimiento por su dedicación y paciencia que han hecho posible la culminación de este anhelado trabajo.

Referencias Bibliográficas

- Alvarado, K. (2022). *Factores asociados a la deserción del uso de métodos anticonceptivos durante la pandemia COVID-19 en usuarias del consultorio de Planificación Familiar del Centro Materno Infantil San Genaro, 2021-2022* (Tesis de pregrado). Recuperado de <http://38.43.142.130/handle/20.500.12672/19518>
- Arias, J., y Covinos, M. (2020). *Metodología y diseño de investigación* (1ra edición.) Peru. *Enfoques Consulting EIRL*. Recuperado de https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26022w/Arias_S2.pdf
- Barrera, L., et al. (2020). *Causas de desapego de los métodos anticonceptivos*. *Ginecología y Obstetricia de Mexico* 2020;88 (Supl 1): S88-S95. Recuperado de <https://doi.org/10.24245/gom.v88iSupl1.3853>
- Buldón, A. (2022). *Determinantes de la salud*. Lafisioterapia.net. Recuperado de <https://lafisioterapia.net/determinantes-de-salud/>
- Colca, M. (2021). *Factores asociados al abandono de los métodos anticonceptivos hormonales según evidencia en los años 2016-2021* (Tesis de pregrado). Recuperado de <https://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/20.500.13053/6260>
- Cruz, L. (2023). *Factores asociados al abandono de métodos anticonceptivos hormonales en mujeres que acuden al Centro de Salud La Libertad durante el mes de enero del año 2023* (Tesis de pregrado). Recuperado de <https://repositorio.urp.edu.pe/handle/20.500.14138/6277>
- Daza, J. (2021). *Factores asociados al abandono de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértiles del Centro de Salud la Esperanza- Ecuador, 2021*(Tesis de maestría). Recuperado de <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/67923>
- Delgadillo, R., et al. (2023). *Causas de Abandono de Métodos de Planificación Familiar en Mujeres en Edad Fértil de la Unidad de Medicina Familiar N.º 73*. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(5), 9443-9455. Recuperado file:///C:/Users/USER/Downloads/Dialnet-CausasDeAbandonoDeMetodosDePlanificacionFamiliarEn-9481845%20(2).pdf

- De la Guardia, M., y Ruvalcaba, J. (2020). *La salud y sus determinantes, promoción de la salud y educación sanitaria*. Journal of Negative and No Positive Results, 5(1), 81-90. Recuperado de <https://scielo.isciii.es/pdf/jonnpr/v5n1/2529-850X-jonnpr-5-01-81.pdf>
- Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (2024). *Cada día doce niñas quedan embarazadas en el Perú*. Nota de prensa UNFPA. Recuperado de <https://peru.unfpa.org/es/news/embarzoadolescenteperu2024>
- Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas (2021). *Planificación familiar, por un mundo con iguales oportunidades*. Nota de prensa UNFPA. Recuperado de <https://peru.unfpa.org/es/who-we-are>
- Flores, A., y Escalante, M. (2022). *Factores de riesgo que influyen en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del P.S I- 2 Taparachi - Juliaca, 2022* (Tesis de pregrado). Recuperado de <https://repositorio.uoosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/1229>
- Gama, N. (2016). *Factores que influyeron en el abandono de métodos anticonceptivos en puérperas, atendidas en el Hospital San Juan de Lurigancho, noviembre - diciembre del 2015* (Tesis de pregrado). Recuperado de <https://core.ac.uk/reader/323344050>
- Girón, J., y Gregorio, L. (2022). *Factores asociados a deserción de métodos anticonceptivos hormonales en mujeres, Centro de Salud Huaura, Lima-2022* (Tesis de pregrado). Recuperado de <https://repositorio.unheval.edu.pe/handle/20.500.13080/8909>
- Gómez, L. (2022). *Factores asociados al abandono del uso de métodos anticonceptivos temporales en mujeres según evidencias científicas en los años 2018 – 2022* (Tesis de pregrado). Recuperado de <https://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/20.500.13053/9264>
- Gutiérrez, S. (2021). *Factores relacionados al abandono del uso de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil del Establecimiento de salud I-4 Catacaos 2021* (Tesis de pregrado). Recuperado de

- <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/88401>
- Hernández, R. (2022). *Factores personales, socioculturales e institucionales asociados al abandono de métodos anticonceptivos en adolescentes* (Tesis de pregrado). Recuperado de <https://repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/10616>
- Huato, A. (2023). *Factores que contribuyen al abandono precoz de los métodos anticonceptivos en planificación familiar*. (Tesis de posgrado). Recuperado de <https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8371>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (2023). *Población peruana alcanzó las 33 millones 726 mil personas en el año 2023*. Nota de prensa del INEI. Recuperado de <https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/nota-de-prensa-no-104-2023-inei.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (2022). *Encuesta demográfica y de salud familiar*. Nota de prensa del INEI. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1898/libro.pdf
- Lara, S. (2020). *Factores asociados al abandono de métodos anticonceptivos en usuarias del Centro de Salud Faucett, Callao 2020* (tesis de maestría). Recuperado de <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/2849357>
- Manterola, C., et al. (2019). *Metodología de los tipos y diseños de estudio más frecuentemente utilizados en investigación clínica*. *Revista Médica Clínica Las Condes* 2019, 30(1), 36-49. Recuperado de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864019300057>
- Ministerio de Educación (2022). *Evaluación Muestral de Estudiantes*. Nota de prensa MINEDU. Recuperado de http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2023/07/Reporte_Factores_Asociados_EM2022.pdf
- Ministerio de Salud (2024). *Cifras de muerte materna se reducen a nivel nacional en comparación con el mismo periodo del año pasado*. Nota de prensa del MINSA. Recuperado de <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/959523-cifras-de-muerte-materna-se-reducen-a-nivel-nacional-en-comparacion-con-el-mismo->

periodo-del-ano-pasado

Ministerio de Salud (2017). *Norma técnica de planificación familiar*. (1ra Edición.) Peru Industria Gráfica MACOLE S.R.L. Recuperado de https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/322903/Norma_t%C3%A9cnica_de_salud_de_planificaci%C3%B3n_familiar20190621-17253-tyg9uv.pdf?v=1634914237

Organización Mundial de la Salud (2024). *Embarazo en la adolescencia*. Datos y cifras de la OMS. Recuperado de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>

Organización Mundial de la Salud (2023). *Planificación familiar/métodos anticonceptivos*. Datos y cifras de la OMS. Recuperado de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception>

Pajares, S. (2021). *Factores de riesgo asociados al abandono de métodos anticonceptivos en el contexto de pandemia covid-19 en mujeres del centro de salud chacra colorada – breña, 2021* (Tesis de pregrado). Recuperado de <http://190.12.84.13:8080/handle/20.500.13084/6682>

Quispe, F. (2023). *Factores asociados en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023*. (Tesis de pregrado). Recuperado de <http://34.127.45.135/handle/UPSC/597>

Quispe, A. (2023). *Factores asociados al abandono de métodos anticonceptivos hormonales en estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2022* (Tesis de pregrado). Recuperado de <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/c6db5ca9-8fee-4ee4-ae22-b0854c3ed55f/content>

Romani, A., y León, A. (2023). *Factores relacionados al abandono del método anticonceptivo hormonal en mujeres en un Centro de Salud Huancayo 2022*. (Tesis de pregrado). Recuperado de

<https://repositorio.upla.edu.pe/handle/20.500.12848/7048>

- Rojas, W., y Pariona, R. (2021). *Factores asociados al abandono del método anticonceptivo hormonal en usuarias del servicio de planificación familiar. C.S. Santa Elena setiembre - noviembre 2021* (Tesis de pregrado). Recuperado de <http://repositorio.unsch.edu.pe/xmlui/handle/UNSCH/4731>
- Sánchez, K., y Pingo, K. (2022). *Factores que influyen en el abandono de métodos anticonceptivos de larga duración en usuarias atendidas en consultorio de planificación familiar del Centro Materno Infantil Santa Luzmila II julio – diciembre 2020* (Tesis de pregrado). Recuperado de <https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/30627>
- Sánchez, J., Fernández, M., y Díaz, J. (2021). *Técnicas e instrumentos de recolección de información: análisis y procesamiento realizado por el investigador cualitativo*. Revista Científica UISRAEL, 8(1), 107. Recuperado de <https://www.studocu.com/ec/document/universidad-de-guayaquil/metodologia-de-investigacion/investigacion-instrumentos-y-tecnicas-cualitativa-cuantitativa/15997919>
- Silva, K. (2020). *Factores de riesgo asociados al abandono de métodos anticonceptivos en mujeres atendidas en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, 2019*. Recuperado de <http://190.12.84.13:8080/handle/20.500.13084/4366>
- Tume, K., y Vásquez, G. (2021). *Factores relacionados al abandono de los métodos anticonceptivos en estudiantes de la Universidad Privada del Norte durante la COVID-19 sede Los Olivos – 2021* (Tesis de pregrado). Recuperado de <https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/28039>
- Velásquez, N. (2022). *Factores que influyen en la no utilización de métodos anticonceptivos en mujeres fértiles* (tesis de pregrado). Recuperado de <https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10224>
- Villar, M. (2011). *Factores determinantes de la salud: Importancia de la prevención*. Acta Médica Peruana, 28(4), 237-241. Recuperado de <http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v28n4/a11.pdf>

Anexos y Apéndices:

Matriz de operacionalización de variables

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala de medición
Factores asociados	considera un factor asociado a la contribución y el desempeño de un papel importante en cambios de los sucesos, además tiene la responsabilidad del control o la variación de las características de las personas y se clasifican en factores personales, socioculturales e institucionales (Romaní y León, 2023, p. 23-25).	Se medirá mediante aplicación de un cuestionario estructurado por el autor en dimensiones como: factores personales, factores socioculturales y factores institucionales conformada por 17 ítems, dimensión factores personales está conformada por 7 ítems, la dimensión factores socioculturales está conformada por 5 ítems y la dimensión factores institucionales está conformada por 5 ítems, se medirán a través de una escala de valoración de MD: Muy en desacuerdo 1 punto D: Desacuerdo 2 puntos I: Indeciso 3 puntos A: De acuerdo 4	Factores Personales	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Edad ▪ Educación ▪ Estado civil ▪ N.º hijos ▪ N.º abortos ▪ N.º pareja sexual ▪ Edad de inicio de relación sexual 	7 ítems	Nominal
			Factores Socioculturales	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Religión ▪ Ocupación ▪ Influencia de la familia ▪ Influencia de los amigos ▪ Influencia de la religión 	5 ítems	Nominal
			Factores Institucionales	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conocimiento del servicio de planificación familiar ▪ Métodos anticonceptivos gratuito ▪ Horario de atención ▪ Calidad de atención del personal de salud ▪ Distancia 	5 ítems	Nominal

		puntos MA: Muy de acuerdo 5 puntos.				
Abandono de los métodos anticonceptivos	en 36 países, dos tercios de las mujeres sexualmente activas que deseaban retrasar o limitar la maternidad suspenden o dejan de usar los métodos anticonceptivos por temor a sus efectos secundarios, por problemas de salud o por subestimar la probabilidad de concepción (OMS, 2024, párr. 1).	Se medirá mediante aplicación de un cuestionario estructurado por el autor en abandono del método anticonceptivo conformada por 1 ítems para completar el motivo de abandono del método anticonceptivo.	Abandono de los métodos anticonceptivos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mencione el motivo por el cual abandono el método anticonceptivo que uso por última vez 	1 ítems	Nominal

Matriz de consistencia

Problema	Variables	Objetivos	Hipótesis	Metodología
<p>¿Cómo se relacionan los factores asociados con el abandono de los de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024?</p>	<p>Variable: Factores asociados</p>	<p>Objetivo general Determinar la relación entre los factores asociados con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.</p>	<p>H₁: Si existe relación entre los factores asociados con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.</p>	<p>Tipo de investigación Observacional sin intervención</p> <p>Según su finalidad aplicada</p> <p>Según su alcance Descriptivo correlacional, de diseño no experimental, transversal.</p> <p>La población muestral de está constituida por 115 usuarias, mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple.</p> <p>La validez será mediante el juicio de expertos en número de 3 profesionales de la salud.</p>
	<p>Variable: Abandono de los métodos anticonceptivos</p>	<p>Objetivos específicos</p> <p>1. Identificar la relación entre los factores personales con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.</p> <p>2. Identificar la relación entre los factores socioculturales con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.</p> <p>3. Identificar la relación entre los factores institucionales con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.</p>	<p>H₀: No existe relación entre los factores asociados con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.</p>	

Instrumentos de recolección de datos

Factores asociados y abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024

Estimada señora, soy egresada de la segunda especialidad de la escuela de enfermería de la Universidad San Pedro Filial Huacho, en esta oportunidad recurro a su voluntad y a la vez hacerle llegar el presente cuestionario, cuyo objetivo es: Determinar la relación entre los factores asociados con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.

A continuación, tiene una serie de preguntas con alternativas, sírvase marcar cada una de ellas y marque la respuesta que usted crea conveniente, sus respuestas tienen carácter reservado. Agradeciendo de antemano su colaboración y participación.

Fecha: ___/___/___

I. Variable 1: Factores Asociados

N.º	Ítems	
Dimensión 1: Factores Personales		
1.	Edad:	<input type="checkbox"/> 15 a 19 años <input type="checkbox"/> 20 a 29 años <input type="checkbox"/> 30 a 39 años <input type="checkbox"/> 40 a 49 años
2	Grado de Instrucción	<input type="checkbox"/> Sin estudio <input type="checkbox"/> Primaria completa <input type="checkbox"/> Primaria incompleta <input type="checkbox"/> Secundaria incompleta <input type="checkbox"/> Secundaria completa <input type="checkbox"/> Superior técnico <input type="checkbox"/> Superior universitario
3	Estado civil	<input type="checkbox"/> Soltera <input type="checkbox"/> Conviviente <input type="checkbox"/> Casada <input type="checkbox"/> Viuda <input type="checkbox"/> Divorciada
4	N.º hijos	<input type="checkbox"/> Ninguno <input type="checkbox"/> 1 a 2 hijos <input type="checkbox"/> Mas de 3 hijos
		<input type="checkbox"/> Ninguno

5	N.º Abortos	() 1 a 2 hijos () Mas de 3 hijos
6	Pareja sexual	() 1 pareja sexual () 2 pareja sexual () 3 a más pareja sexual
7	Edad inicio de relación sexual	() Antes de 15 años () 15 a 20 años () 20 a más años

Escala de valoración:

Muy en desacuerdo MD	Desacuerdo D	Indeciso I	De acuerdo A	Muy de acuerdo MA
1	2	3	4	5

N.º	ítems	MD	D	I	A	MA
Dimensión 2: Factores Socioculturales						
8	¿Cuándo usted abandono el uso del método anticonceptivo pertenecía a la religión:?					
9	¿Cuándo usted abandono el uso del método anticonceptivo su ocupación era:?					
10	¿Siente Ud. que sus familiares influyeron en su decisión para abandonar el método anticonceptivo?					
11	¿Siente Ud. que sus amigos influyeron en su decisión para abandonar el método anticonceptivo?					
12	¿considera usted que la religión influye en el abandono de los métodos anticonceptivos?					
Dimensión 3: Factores Institucionales						
13	¿Ud. tenía conocimiento que el Hospital Barranca cuenta con el servicio de planificación familiar?					

14	¿Ud. sabía que el servicio de planificación familiar del Hospital Barranca ofrece métodos anticonceptivos de forma gratuita?					
15	¿Ud. sabía que los horarios de atención del servicio de planificación familiar están disponibles de lunes a sábado en los turnos mañana y tarde?					
16	¿usted considera que el personal de salud respondió satisfactoriamente a sus inquietudes y dudas y reconoció su necesidad de método anticonceptivos.?					
17	¿La distancia de su vivienda al establecimiento de salud fue un factor para no acudir su cita del servicio de planificación familiar?					

II. Variable 2: Abandono de los Métodos Anticonceptivos

N.º	Ítems
Dimensión 1: Abandono de los Métodos Anticonceptivos	
18	Mencione el motivo por el cual abandono el método anticonceptivo que uso por última vez: ----- -----

Validez y Confiabilidad

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
VALIDEZ DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS

I. Información General

Nombre y apellido del validador: Jaqueline Lorta Montañez Sulca

Fecha: 12/11/24 Especialidad: Enfermería en Gineco Obstétrica

Nombre del instrumento evaluado: Cuestionario

Autor del instrumento: Antonia Isabel Lobatón Espinoza de Avila

Teniendo como base los criterios que a continuación se presentan, requerimos su opinión sobre el instrumento de la investigación titulada:

“Factores asociados y abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024”

II. Aspectos a evaluar (Calificación cuantitativa)

Indicadores de evaluación del instrumento	Criterios cualitativos - cuantitativos	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		(1-9)	(10-13)	(14-16)	(17-18)	(19-20)
Claridad	¿Está formulado con lenguaje apropiado?			16		
Objetividad	¿Está expresado con conductas observadas?			16		
Actualidad	¿Adecuado al avance de la ciencia y calidad?			16		
Organización	¿Existe una organización lógica del instrumento?			16		
Suficiencia	¿Valora los aspectos en cantidad y calidad?			16		
Intencionalidad	¿Adecuado para cumplir con los objetivos?			16		
Consistencia	¿Basado en el aspecto teórico científico del tema de estudios?			16		
Coherencia	¿Entre las hipótesis, dimensiones e indicadores?			16		
Propósito	¿Las estrategias responden al propósito del estudio?				17	
Conveniencia	¿Genera nuevas pautas para la investigación y construcción de teorías?				17	
Sumatoria parcial				128	34	
Sumatoria Total		162				
Valoración cuantitativa (sumatoria Total x 0.005)				0.81		

Aportes y/o sugerencias para mejorar el instrumento

El instrumento puede ser aplicado, cumple con la validez para el trabajo científico.

III. Calificación global: Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo respectivo y escriba sobre el espacio el resultado.

Intervalos	Resultados
0,00 – 0,49	Validez nula
0,50 – 0,59	Validez muy baja
0,60 – 0,69	Validez baja
0,70 – 0,79	Validez aceptable
0,80 – 0,89	Validez buena
0,90 – 1,00	Validez muy buena

Coeficiente de validez

$$\boxed{162} = \boxed{0,81}$$

Nota: El instrumento podrá ser considerado a partir de una calificación aceptable


Lic. Montañez Sulca Jaqueline Lorta

Apellidos y Nombres: Montañez Sulca Jaqueline Lorta

Especialidad: Segunda Especialidad Profesional en Enfermería Gineco Obstétrica

Grado: Magister en Gestión Pública

DNI. 33331605

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
VALIDEZ DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS

I. Información General

Nombre y apellido del validador: Maura Azucena Flores Méndez

Fecha: 20/11/24 Especialidad: Enfermería en Gineco Obstétrica

Nombre del instrumento evaluado: Cuestionario

Autor del instrumento: Antonia Isabel Lobatón Espinoza de Avila

Teniendo como base los criterios que a continuación se presentan, requerimos su opinión sobre el instrumento de la investigación titulada:

“Factores asociados y abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024”

II. Aspectos a evaluar (Calificación cuantitativa)

Indicadores de evaluación del instrumento	Criterios cualitativos - cuantitativos	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		(1-9)	(10-13)	(14-16)	(17-18)	(19-20)
Claridad	¿Está formulado con lenguaje apropiado?				18	
Objetividad	¿Está expresado con conductas observadas?				18	
Actualidad	¿Adecuado al avance de la ciencia y calidad?				17	
Organización	¿Existe una organización lógica del instrumento?				17	
Suficiencia	¿Valora los aspectos en cantidad y calidad?				17	
Intencionalidad	¿Adecuado para cumplir con los objetivos?				18	
Consistencia	¿Basado en el aspecto teórico científico del tema de estudios?				17	
Coherencia	¿Entre las hipótesis, dimensiones e indicadores?				18	
Propósito	¿Las estrategias responden al propósito del estudio?				17	
Conveniencia	¿Genera nuevas pautas para la investigación y construcción de teorías?				17	
Sumatoria parcial						
Sumatoria Total		174				
Valoración cuantitativa (sumatoria Total x 0.005)					0.87	

Aportes y/o sugerencias para mejorar el instrumento

El instrumento puede ser aplicado, cumple con la validez para el trabajo científico.

III. Calificación global: Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo respectivo y escriba sobre el espacio el resultado.

Intervalos	Resultados
0,00 – 0,49	Validez nula
0,50 – 0,59	Validez muy baja
0,60 – 0,69	Validez baja
0,70 – 0,79	Validez aceptable
0,80 – 0,89	Validez buena
0,90 – 1,00	Validez muy buena

Coeficiente de validez

$$\boxed{174} = \boxed{0,87}$$

Nota: El instrumento podrá ser considerado a partir de una calificación aceptable



Apellidos y Nombres: Flores Méndez Maura Azucena

Especialidad: Segunda Especialidad Profesional en Enfermería Gineco Obstétrica

Grado: Magíster en Educación con mención en Docencia en el Nivel Superior

DNI. 31632367

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
VALIDEZ DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS

I. Información General

Nombre y apellido del validador: Norma Carmen Sánchez Trejo

Fecha: 20/11/24 Especialidad: Enfermería en Gineco Obstétrica

Nombre del instrumento evaluado: Cuestionario

Autor del instrumento: Antonia Isabel Lobatón Espinoza de Avila

Teniendo como base los criterios que a continuación se presentan, requerimos su opinión sobre el instrumento de la investigación titulada:

“Factores asociados y abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024”

II. Aspectos a evaluar (Calificación cuantitativa)

Indicadores de evaluación del instrumento	Criterios cualitativos - cuantitativos	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		(1-9)	(10-13)	(14-16)	(17-18)	(19-20)
Claridad	¿Está formulado con lenguaje apropiado?			16		
Objetividad	¿Está expresado con conductas observadas?			16		
Actualidad	¿Adecuado al avance de la ciencia y calidad?			16		
Organización	¿Existe una organización lógica del instrumento?				17	
Suficiencia	¿Valora los aspectos en cantidad y calidad?				17	
Intencionalidad	¿Adecuado para cumplir con los objetivos?				17	
Consistencia	¿Basado en el aspecto teórico científico del tema de estudios?				17	
Coherencia	¿Entre las hipótesis, dimensiones e indicadores?				17	
Propósito	¿Las estrategias responden al propósito del estudio?				17	
Conveniencia	¿Genera nuevas pautas para la investigación y construcción de teorías?				17	
Sumatoria parcial				48	119	
Sumatoria Total		167				
Valoración cuantitativa (sumatoria Total x 0.005)					0.84	

Aportes y/o sugerencias para mejorar el instrumento

El instrumento puede ser aplicado, cumple con la validez para el trabajo científico.

III. Calificación global: Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo respectivo y escriba sobre el espacio el resultado.

Intervalos	Resultados
0,00 – 0,49	Validez nula
0,50 – 0,59	Validez muy baja
0,60 – 0,69	Validez baja
0,70 – 0,79	Validez aceptable
0,80 – 0,89	Validez buena
0,90 – 1,00	Validez muy buena

Coeficiente de validez

$$\boxed{167} = \boxed{0,84}$$

Nota: El instrumento podrá ser considerado a partir de una calificación aceptable



Apellidos y Nombres: Sánchez Trejo Norma Carmen

Especialidad: Segunda Especialidad Profesional en Enfermería Gineco Obstétrica

DNI. 40077662

Base de datos

Factores asociados y abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.																		
N	EDAD	Factores personales							Factores Institucionales									
		INSTRUCCION	Nivelación	ECVIL	NIÑOS	ABORTO	MPSESUAL	EDADES	RELIGION	OCCUPACION	Factores Sociodemográficos							
										F804-Fam.Rta	F805-Am.Ígus	F807-Religion	F81-CPP	F82-CMA	F83-HOR	F85-PDR	F86-ES	Motivo-Abandono
1	2	5	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2	1	5	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2
3	2	5	1	2	2	1	2	1	1	5	1	2	1	2	2	2	1	2
4	4	7	3	3	2	2	3	2	1	4	1	1	1	2	2	2	1	1
5	3	7	3	1	1	1	2	2	1	4	1	1	1	2	2	2	1	2
6	2	6	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1
7	2	6	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2
8	2	7	3	2	1	1	3	3	5	4	1	2	1	2	2	1	1	2
9	3	7	3	1	2	2	1	3	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2
10	1	5	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1
11	2	6	2	2	2	1	1	2	1	5	1	1	1	2	2	1	1	2
12	2	7	3	2	2	1	1	2	1	5	2	1	2	2	1	2	1	2
13	2	7	3	1	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2
14	3	6	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2
15	2	6	2	1	2	1	1	2	1	5	1	1	1	2	2	1	1	2
16	3	7	3	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2
17	1	4	1	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
18	3	7	3	1	2	1	1	3	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2
19	3	3	1	2	3	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1
20	2	6	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2
21	2	6	2	2	1	1	3	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2
22	1	5	1	2	1	1	1	2	1	5	2	1	2	2	2	2	1	1
23	1	5	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1
24	4	5	1	3	2	1	3	2	1	5	2	1	2	2	2	2	1	2
25	3	7	3	3	2	1	3	2	1	5	2	1	2	2	2	1	2	2
26	1	5	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1
27	3	7	3	1	1	1	1	2	1	4	2	1	2	2	2	2	1	2
28	3	6	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2
29	2	6	2	1	1	2	1	1	1	4	2	1	2	2	1	1	1	2
30	1	7	3	3	2	2	2	3	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1
31	2	6	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2
32	2	4	1	1	2	2	2	2	1	5	2	2	2	2	2	2	1	1
33	2	5	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1
34	2	5	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1
35	2	7	3	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1
36	2	7	3	1	2	2	2	2	3	4	2	1	2	2	1	1	1	1
37	3	6	2	2	1	2	2	1	1	5	2	2	2	2	2	2	2	1
38	3	7	3	2	3	1	2	2	5	2	2	2	2	2	2	1	2	2
39	1	7	3	2	2	1	2	3	1	5	2	2	2	2	2	2	2	2
40	3	6	2	2	2	1	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2
41	1	5	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1
42	3	6	2	2	2	1	2	2	1	5	2	2	2	2	2	2	1	2
43	1	7	3	3	3	1	2	2	1	4	2	1	2	2	2	1	2	2
44	3	5	1	3	3	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2
45	2	6	2	1	1	1	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1
46	2	6	2	2	1	2	1	2	1	5	2	1	2	2	2	2	2	2
47	2	5	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
48	2	5	1	3	2	1	1	1	1	5	1	2	1	2	2	1	1	1
49	3	4	1	2	2	1	1	2	2	3	1	2	1	2	2	1	1	1
50	2	5	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
51	4	6	2	2	1	1	3	2	1	4	2	1	2	2	2	1	2	2
52	4	7	3	1	2	1	2	2	3	5	2	1	2	2	2	2	2	3
53	1	7	3	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2
54	2	7	3	1	1	1	2	3	1	5	2	1	2	2	2	2	1	2
55	3	6	2	1	1	2	2	2	3	5	1	2	1	1	1	1	2	2
56	3	5	1	2	3	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1
57	2	6	2	2	1	2	1	2	1	5	2	1	2	2	2	2	1	2
58	3	5	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
59	4	4	1	3	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2
60	3	3	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2
61	2	5	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1
62	1	6	1	2	2	1	1	2	1	3	1	2	1	2	2	1	1	1
63	2	4	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1
64	3	4	1	2	3	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2
65	1	5	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2
66	4	5	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2
67	2	6	2	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
68	3	5	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2
69	3	5	1	2	2	1	2	2	1	5	2	2	2	2	2	2	1	1
70	2	6	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
71	3	3	1	2	2	1	1	2	1	3	1	2	1	2	2	1	2	1
72	3	5	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1
73	1	4	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2
74	3	5	1	2	3	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1
75	4	5	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
76	2	6	2	1	1	2	2	2	1	5	2	1	2	2	2	2	1	2
77	3	5	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2
78	1	4	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2
79	2	5	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2
80	4	5	1	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2
81	2	5	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	2	1
82	2	6	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1
83	4	6	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1
84	3	6	2	2	2	1	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2
85	2	4	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1
86	4	7	3	2	1	2	1	2	1	4	2	1	2	2	2	2	1	1
87	2	5	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1
88	3	6	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2
89	2	5	1	1	1	1	1	2	1	4	2	1	2	2	2	1	2	2
90	3	6	2	3	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2
91	3	2	1	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2
92	2	4	1	3	2	1	1	1	1	5	2	1	2	1	1	1	2	2
93	2	5	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2
94	4	5	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1
95	2	6	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1
96	3	6	2	1	2	1	2	2	3	5	2	2	2	2	2	2	2	2
97	1	5	1	2	2	1	1	2	1	4	2	1	2	2	2	2	2	1
98	2	7	3	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1
99	2	5	1	3	1	1	2	2	5	2	1	1	1	2	2	1	2	2
100	3	5	2	2	2	1	2	2	1									

Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE
INVESTIGACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Nivel de estudio : Segunda Especialidad

Introducción:

Lo invito a participar del estudio de investigación denominado.

“Factores asociados y abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de
edad fértil, Hospital Barranca 2024”

Este es un estudio desarrollado por: Lobatón Espinoza de Avila Antonia Isabel
perteneciente a la Universidad San Pedro – SEDE/FILIAL Huacho.

El objetivo de esta investigación es:

“Determinar la relación entre los factores asociados con el abandono de los métodos
anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024”

El propósito será identificar de manera clara y objetiva las debilidades, problemáticas
presentadas al momento de brindar los servicios para poder mejorar la calidad de
atención en los establecimiento de salud, por este motivo es necesario profundizar más
este tema y abordarlo con la debida importancia que amerita.

Metodología:

El tipo de investigación que se propone es una investigación un estudio observacional
sin intervención, de acuerdo a su finalidad será una investigación aplicada y por su
alcance una investigación descriptiva correlacional.

Beneficios:

No existe beneficio directo para usted por participar de este estudio. Sin embargo, se
le informará de manera personal y confidencial de algún resultado que se crea
conveniente que usted necesite conocer. Los resultados también serán enviados a la
Unidad de Gestión de la Calidad del Hospital de Barranca.

Costos e incentivos:

Usted no realizará ningún gasto por participar de este estudio.

Confidencialidad:

Su información está protegida ya que su participación es anónima, usaremos códigos
de identificación internos los cuales mantendrán su privacidad. Si los resultados de

este estudio son publicados en una revista científica, no se mostrará ningún dato que permita la identificación de su persona. Sus archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento.

Consentimiento:

Acepto voluntariamente a participar en este estudio, he comprendido perfectamente la información que se me ha brindado sobre las cosas que van a suceder si participo en el presente estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento.

Código de Participante :


Nombre :

Fecha :

Firma del Participante

Solicitud a la institución donde se va desarrollar la investigación

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de la heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



Barranca 21 de febrero de 2024

Sr.
Dr. Jorge Luis Ruiz Prieto
Director Ejecutivo del Hospital Barranca Cajatambo y SBS



Presente. –

Reciba el saludo de la Dirección de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad San Pedro para felicitarle por su exitosa gestión y en esta oportunidad solicitarle el apoyo de su representada para facilitar la ejecución de la investigación titulada, **Factores asociados y abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024**, a cargo del estudiante: Antonia Isabel Lobatón Espinoza de Avila, con código 2008114005 e identificada con DNI 40264488, permitiéndole aplicar los instrumento de investigación, para obtener información de estricto uso académico en el Servicio de Hospitalización de Gineco Obstetricia a las usuarias que estén dispuestas a participar. Por la cual adjunto a la presente la documentación pertinente y como usted podrá apreciar el estudio no revela la razón social de su representada, cuidados éticos que tomamos muy en cuenta.

Agradecemos anticipadamente el apoyo a la investigación científica, brindándoles a los investigadores las facilidades del caso.

Atentamente.

 UNIVERSIDAD SAN PEDRO
CHIMBOTE
Agapito Enriquez Valera
Dr. Agapito Enriquez Valera
DIRECTOR ESC. ENFERMERIA

Director del programa



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
HOSPITAL BARRANCA - CAJATAMBO Y SBS

Unidad de Apoyo a la Docencia e
Investigación
Reg. Doc. 5296703
Reg. Exp. 3138460

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA HOMBRES Y MUJERES"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION

Barranca, 02 de abril del 2024

CARTA N° 159 -2024-GRL-DSGRL-DIRESA-L/UE1289/DE-UADI

LOBATON ESPINOZA DE AVILA, ANTONIA ISABEL

Presente. -

ASUNTO : RESPUESTA A LO SOLICITADO
REF. : EXPEDIENTE N°3138460 – DOCUMENTO N°5138157

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted., para hacerle llegar mis saludos cordiales y al mismo tiempo dar respuesta al documento de la referencia con EXPEDIENTE N°3138460 – DOCUMENTO N° 5138157.

Por tal sentido se hace de conocimiento que esta **Entidad** por intermedio del Departamento de Gineco Obstetricia y Unidad Gestión de la Calidad remiten **OPINION FAVORABLE**, para la realización de su proyecto de investigación denominada: "FACTORES ASOCIADOS Y ABANDONO DE LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES DE EDAD FERTIL, HOSPITAL BARRANCA 2024".

Sin otro particular expreso a Usted, las muestras de mi especial consideración y alta estima personal.

Atentamente,



Folios:
JLRP/JARV/kjgj
C.c. Archivo.


GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO SBS
M.C. Jorge Luis Ruiz Prieto
C.M.P. N° 039276
DIRECTOR EJECUTIVO

Página web www/hospitalbarranca.gob.pe

Dirección: Av. Nicolas de Piérola N°210-224 Barranca
Telefax: N° 2352075 Central: 2352156 – 2352241 Anexo 103

Resultados Generales




Figura 1. Determinar la relación entre los factores asociados con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.




Figura 2. Identificar la relación entre los factores personales con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.




Figura 3. Identificar la relación entre los factores socioculturales con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.




Figura 4. Identificar la relación entre los factores institucionales con el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024.

Repositorio institucional digital



REPOSITORIO INSTITUCIONAL DIGITAL

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

1. Información del Autor				
Lobatón Espinoza de Avila Antonia Isabel		40264488	isabel.lobaton240779@gmail.com	
Apellidos y Nombres		DNI	Correo Electronico	
2. Tipo de Documento de Investigación				
<input checked="" type="checkbox"/>	Tesis	<input type="checkbox"/>	Trabajo de Suficiencia Profesional	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Trabajo Académico	<input type="checkbox"/>
			Trabajo de Investigación	
3. Grado Académico o Título Profesional ¹				
<input type="checkbox"/>	Bachiller	<input type="checkbox"/>	Título Profesional	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Título Segunda Especialidad	<input type="checkbox"/>
			Maestría	<input type="checkbox"/>
			Doctorado	
4. Título del Documento de Investigación				
“Factores asociados y abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, Hospital Barranca 2024”				
5. Programa Académico				
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN GINECO OBSTÉTRICA.				
6. Tipo de Acceso al Documento				
<input checked="" type="checkbox"/>	Abierto o Publico (info:erepo/semantics/restrictedAccess)		<input type="checkbox"/>	
			Acceso restringido (info:erepo/semantics/restrictedAccess)	
(*) En caso de restringido sustentar motivo				

A. Originalidad del Archivo Digital

Por el presente dejo constancia que el archivo digital que entrego a la Universidad, es la versión final del trabajo de investigación sustentado y aprobado por el Jurado Evaluador y forma parte del proceso que conduce a obtener el grado académico o título profesional.

B. Otorgamiento de una licencia CREATIVE COMMONS ⁵

El autor, por medio de este documento, autoriza a la Universidad, publicar su trabajo de investigación en formato digital en el Repositorio Institucional Digital, al cual se podrá acceder, preservar y difundir de forma libre y gratuita, de manera íntegra a todo el documento.



Firma

Lugar	Día	Mes	Año
Chimbote	21	04	2025

Important


- Según Resolución de Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU-CD, Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar Grados Académicos y Títulos Profesionales, Art. 8, inciso 8.2.
- Ley N° 30035. Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto y D.S. 006-2015-PCM.
- Si el autor eligió el tipo de acceso abierto o público, otorga a la Universidad San Pedro una licencia no exclusiva, para que se pueda hacer arreglos de forma en la obra y difundir en el Repositorio Institucional Digital. Respetando siempre los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual de acuerdo y en el Marco de la Ley 822.
- En caso de que el autor elija la segunda opción, únicamente se publicará los datos del autor y resumen de la obra, de acuerdo a la directiva N° 004-2016-CONCYTEC-DEGC (Numerales 5.2 y 6.7) que norma el funcionamiento del Repositorio Nacional Digital.
- Las licencias Creative Commons (CC) es una organización internacional sin fines de lucro que pone a disposición de los autores un conjunto de licencias flexibles y de herramientas tecnológicas que facilitan la difusión de información, recursos educativos, obras artísticas y científicas, entre otros. Estas licencias también garantizan que el autor obtenga el crédito por su obra.
- Según el inciso 12.2, del artículo 12° del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales-RENATI "Las universidades, instituciones y escuelas de educación superior tienen como obligación registrar todos los trabajos de investigación y proyectos, incluyendo los metadatos en sus repositorios institucionales precisando si son de acceso abierto o restringido, los cuales serán posteriormente recolectados por el Repositorio Digital RENATI, a través del Repositorio ALICIA".

Nota - En caso de falsedad en los datos, se procederá de acuerdo a ley (Ley 27444, art. 32, núm. 32.3).

Reporte de similitud

FACTORES ASOCIADOS Y ABANDONO DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES DE EDAD FÉRTIL, HOSPITAL BARRANCA 2024.

INFORME DE ORIGINALIDAD



FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	6%
2	repositorio.usanpedro.edu.pe Fuente de Internet	3%
3	repositorio.uwiener.edu.pe Fuente de Internet	2%
4	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	1%
5	repositorio.uoosevelt.edu.pe Fuente de Internet	1%
6	repositorio.unfv.edu.pe Fuente de Internet	1%
7	repositorio.uladech.edu.pe Fuente de Internet	1%
8	repositorio.upsc.edu.pe Fuente de Internet	1%

9	repositorio.upla.edu.pe Fuente de Internet	1%
10	repositorio.unheval.edu.pe Fuente de Internet	1%
11	repositorio.unica.edu.pe Fuente de Internet	<1%
12	repositorio.upao.edu.pe Fuente de Internet	<1%
13	Submitted to Universidad Privada Antenor Orrego Trabajo del estudiante	<1%
14	cybertesis.unmsm.edu.pe Fuente de Internet	<1%
15	repositorio.unjfsc.edu.pe Fuente de Internet	<1%
16	alicia.concytec.gob.pe Fuente de Internet	<1%
17	Submitted to UTEC Universidad de Ingenieria & Tecnologia Trabajo del estudiante	<1%
18	ciencialatina.org Fuente de Internet	<1%
19	repositorio.untumbes.edu.pe Fuente de Internet	<1%

20	repositorio-indicasat.org.pa Fuente de Internet	<1 %
21	www.saludconlupa.com Fuente de Internet	<1 %
22	Submitted to Universidad Nacional del Centro del Peru Trabajo del estudiante	<1 %
23	www.researchgate.net Fuente de Internet	<1 %
24	Submitted to Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Trabajo del estudiante	<1 %
25	apirepositorio.unh.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
26	repositorio.unsch.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
27	repositorio.unac.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
28	Submitted to Universidad Privada San Pedro Trabajo del estudiante	<1 %
29	repositorio.unp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
30	repositorio.ug.edu.ec Fuente de Internet	<1 %

31	view.genial.ly Fuente de Internet	<1%
32	repositorio.upsb.edu.pe Fuente de Internet	<1%
33	www.coursehero.com Fuente de Internet	<1%
34	repositorio.uss.edu.pe Fuente de Internet	<1%
35	ri-ng.uaq.mx Fuente de Internet	<1%
36	Submitted to Universidad Da Vinci de Guatemala Trabajo del estudiante	<1%
37	Submitted to Universidad Andina del Cusco Trabajo del estudiante	<1%
38	Submitted to Universidad Autónoma de Nuevo León Trabajo del estudiante	<1%
39	repositorio.uch.edu.pe Fuente de Internet	<1%
40	repositorio.unasam.edu.pe Fuente de Internet	<1%
41	www.risti.xyz Fuente de Internet	<1%

42	www.slideshare.net Fuente de Internet	<1%
43	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante	<1%
44	Submitted to Consorcio CIXUG Trabajo del estudiante	<1%
45	Submitted to Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez Trabajo del estudiante	<1%
46	Submitted to Universidad Manuela Beltrán Trabajo del estudiante	<1%
47	Submitted to ABV-Indian Institute of Information Technology and Management Gwalior Trabajo del estudiante	<1%
48	Submitted to Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC Trabajo del estudiante	<1%
49	publicaciones.usanpedro.edu.pe Fuente de Internet	<1%
50	www.care.org.pe Fuente de Internet	<1%
51	archivo.cepal.org Fuente de Internet	<1%
	colegio.uach.mx	

52	Fuente de Internet	<1 %
53	dspace.utb.edu.ec Fuente de Internet	<1 %
54	repositorio.uigv.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
55	repositorio.uam.es Fuente de Internet	<1 %
56	uconline.mx Fuente de Internet	<1 %
57	cimt.uchile.cl Fuente de Internet	<1 %
58	ebin.pub Fuente de Internet	<1 %
59	repositorio.uap.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
60	repositorio.unan.edu.ni Fuente de Internet	<1 %
61	repositorio.unap.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
62	www.finsol.socioeco.org Fuente de Internet	<1 %
63	www.uniagraria.edu.co Fuente de Internet	<1 %

64	www2.junaeb.cl Fuente de Internet	<1 %
65	centros6.pntic.mec.es Fuente de Internet	<1 %
66	dspace.unl.edu.ec Fuente de Internet	<1 %
67	issuu.com Fuente de Internet	<1 %
68	ouci.dntb.gov.ua Fuente de Internet	<1 %
69	paso3diseodelblog.blogspot.com Fuente de Internet	<1 %
70	publicacionescd.ulead.edu.ec Fuente de Internet	<1 %
71	rdu.unc.edu.ar Fuente de Internet	<1 %
72	repositorio.ucsg.edu.ec Fuente de Internet	<1 %
73	repositorio.uia.ac.cr:8080 Fuente de Internet	<1 %
74	repositorio.unprg.edu.pe:8080 Fuente de Internet	<1 %
75	repositorio.upeu.edu.pe:8080 Fuente de Internet	<1 %

76	repositorio.urp.edu.pe Fuente de Internet	<1%
77	www.grafiati.com Fuente de Internet	<1%
78	www.mayoclinic.org Fuente de Internet	<1%
79	www.repositorio.usanpedro.edu.pe Fuente de Internet	<1%
80	www.synergyaids.com Fuente de Internet	<1%
81	repositorio.utn.edu.ec Fuente de Internet	<1%

Excluir citas

Apagado

Excluir coincidencias < 6 words

Excluir bibliografía

Activo