

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD MEDICINA HUMANA
Escuela de Medicina



**CORRELACIÓN ENTRE LA PÉRDIDA SANGUÍNEA ESTIMADA
VISUALMENTE Y LA CALCULADA EN PARTOS EUTÓCICOS
ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL EGB-NUEVO CHIMBOTE,
2015**

Tesis para optar el Título Profesional de Médico Cirujano

Elaborado por :

BRAVO BRAVO ALESSANDRA ANNIE

CHIMBOTE

2016

Resumen

Con la finalidad de determinar la correlación entre la pérdida sanguínea estimada visualmente y la pérdida sanguínea calculada en partos eutócicos atendidos en el Hospital Regional EGB-Nuevo Chimbote durante el 2015, se realizó el siguiente estudio correlacional en 83 mujeres. Se evaluó el coeficiente de correlación de Spearman con un nivel de significancia del 95% entre la pérdida sanguínea estimada visualmente y la pérdida calculada en relación a la variación de hematocrito preparto y posparto. Se encontró que el 78,3% de la estimación visual se reportan como menores a 250mL y en el grupo de la cuantificación calculada el 62,7% se determinó como pérdidas mayores a 500mL. El descenso del hematocrito entre el preparto y posparto fue de 4%. El coeficiente de correlación de Spearman fue de 0,287 y el índice de Kappa de concordancia fue de -0,001 siendo la correlación débil y no existiendo concordancia. La pérdida sanguínea calculada fue más sensible en la determinación de la hemorragia posparto 63,9% vs 2,4% de la estimación visual. El estudio concluye afirmando que la correlación entre la pérdida calculada y la estimada visualmente es débil, que no existe concordancia y que la pérdida calculada es más sensible en el diagnóstico de hemorragia del posparto.