

**UNIVERSIDAD SAN PEDRO**  
**FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD**  
**Escuela de Enfermería**



**Factores de riesgo desencadenantes del trabajo de parto pre termino en  
adolescentes embarazadas primigestas en el Hospital Cayetano Heredia de  
Piura agosto - noviembre 2014**

Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Enfermería

Elaborado por :

CASTILLO DOMINGUEZ MARINA

PIURA

2015

## Resumen

La presente investigación se realizó, con el Objetivo: Determinar los factores de riesgos desencadenantes del trabajo de parto pre término en embarazadas adolescentes primigestas del Hospital Cayetano Heredia de Piura de Agosto a Noviembre del 2014. Material y Métodos: Fue de tipo cuantitativo, prospectivo, transversal, descriptivo, analítico y comparativo. La muestra fue de 78 gestantes adolescentes. Los datos se recolectaron a través de una encuesta elaborada y validada por Rudy Anais Olaya Guzmán con un cuestionario para recolectar la información. Resultados: El 17% tienen 17, el 30% 18,4% de 16,3% 19 años de edad. Grado de instrucción: El 47,6% secundaria incompleta, el 30,4% secundaria completa, el 17,4% primaria completa y el 4,3% primaria incompleta. El estado civil el 60,9% solteras y el 39,1% casadas. Ocupación: 60,9% son trabajadoras de hogar, 26,1% estudiantes y el 13% amas de casa. En cuanto a semanas de gestación el 26,1% tenían 28, el 21,7% a 30 y el 13,2% 27.. Los controles prenatales el 56,5% entre 2 a 3 veces, el 34,8% no se controló y el 8,7% más de 4. De acuerdo a enfermedades maternas el 43,5% presentaron anemia, el 30,4% infección de vías urinarias y el 13% infección vaginal. Enfermedades asociadas a la gestación el 56,5% pre eclampsia, el 26,1% trastornos asociados al líquido amniótico y el 4,3% a malformaciones congénitas. Según resultante neonatal: el 82,6% presentaron un APGAR de 8, el 13,0% de 7 y el 4,3% de 9. Talla entre 46 a 48 centímetros el 60,9%, entre 43 a 45 el 26,1% y el 13% entre 49 y 50 centímetros. Y en relación a peso: el 34,8% entre 1700 a 2100 gramos, el 17,4% entre 2001 a 2300 y el 4,3% entre 1500 a 1700 gramos. Y referente a vía de parto el 73,9% fue vaginal y el 26,1% cosaria. Conclusiones las madres presentaron infecciones de vías urinarias, no control del embarazo, preclamsia, y el neonato bajo peso y talla, APGAR entre 7 y 8. Recomendaciones: Continuar desarrollando programas de educación sexual y seguimiento en los establecimientos de salud a quienes abandonan los controles.