

**UNIVERSIDAD SAN PEDRO**  
**FACULTAD MEDICINA HUMANA**  
Escuela de Medicina



**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL DESARROLLO DE ASFIXIA  
PERINATAL EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL  
III ESSALUD CHIMBOTE, 2011 – 2015.**

Tesis para optar el Título Profesional de Médico Cirujano

Elaborado por :

MEZA ESQUIVEL MELVA EUNICE

CHIMBOTE

2016

## Resumen

La asfixia perinatal es prevenible mediante la modificación de factores de riesgo que influyen en su aparición. Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados al desarrollo de asfixia perinatal en recién nacidos en el servicio de neonatología del hospital III EsSalud Chimbote, 2011 - 2015. Metodología: Estudio de casos y controles, retrospectivo, con una relación 1:1 (50:50), a través del método aleatorio sistemático, además las asociaciones se evaluaron con la prueba chi cuadrado, p valor, odds ratio e intervalo de confianza 95%. Resultados: El síndrome de aspiración meconial (X2 8,841 p 0,002 OR 15,473), líquido amniótico meconial (X2 11,253 p 0,001 OR 4,935) y sufrimiento fetal 4 agudo (X2 5,488 p 0,019 OR 4,472), se asociaron significativamente al desarrollo de asfixia perinatal. Conclusiones: Los factores de riesgo asociados fueron síndrome de aspiración meconial, líquido amniótico meconial y sufrimiento fetal. No se demostró que fueran factores de riesgo el trabajo de parto prolongado, ruptura prematura de membrana, desprendimiento prematuro de placenta, oligohidramnios, prematuridad, preeclampsia.