

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD MEDICINA HUMANA
Escuela de Medicina



**“Prematuridad como factor asociado para sepsis del recién nacido en el
Hospital Regional – Nuevo Chimbote durante el 2016”**

Tesis para optar el Título Profesional de Médico Cirujano

Elaborado por :

GARCIA VERGARA VICTOR YAMIR

CHIMBOTE

2017

Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo estudiar prematuridad como factor asociado en la aparición de la sepsis en neonatos atendidos en el hospital Eleazar Guzmán Barrón - Nuevo Chimbote entre enero a diciembre del 2016, debido al porcentaje de morbilidad y mortalidad. Por lo que se realizó este estudio transversal analítico, donde se aplicaron estadística descriptiva como son las medidas de tendencia central (promedios y medianas) y medidas de dispersión como la desviación estándar, para medir la asociación de la ocurrencia de sepsis neonatal con la prematuridad se utilizó la prueba de chi cuadrado, con una confiabilidad de 0,05. Se encontró el promedio de edad de los 48 neonatos con diagnóstico de sepsis neonatal es de 36,21 semanas, el peso promedio de 2639,08 gramos, el sexo masculino se presentó con una frecuencia de 56,25%. El mayor porcentaje de neonatos con sepsis fue el grupo sin prematuridad 17 (35,4%), seguido del grupo con prematuridad leve con 15 (31,3%), seguido de 13 (27,1%) de prematuridad moderada y la mínima frecuencia observada fue de 3 (6,3%) de prematuridad extrema. Se encontró relación entre la prematuridad y la sepsis neonatal χ^2 de 12,44 y un p valor de 0,0011 (