

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD MEDICINA HUMANA
Escuela de Medicina



**?COMPLICACIONES DE PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL, EN
EL HOSPITAL III ESSALUD CHIMBOTE, AÑO 2013 - 2017?**

Tesis para optar el Título Profesional de Médico Cirujano

Elaborado por :

TORRES PONTE KEVIN EDSON

CHIMBOTE

2018

Resumen

El presente trabajo tuvo como interrogante a investigar qué complicaciones existen en pacientes en diálisis peritoneal, en el Hospital III EsSalud Chimbote, Año 2013 – 2017; Siendo la diálisis peritoneal en la unidad de nefrología un método sustitutivo de la función renal, el tipo de diálisis en el cual incluirá diálisis peritoneal continua ambulatoria y diálisis peritoneal automática además incluirá los tipos de complicaciones que son las siguientes: fuga de líquido falta de flujo, dolor, erosión de cuff, mecánicas, hidroelectrolíticas, metabólicas, peritonitis, orificio de salida, túnel subcutáneo, y será por ultimo evaluado en los pacientes del hospital III EsSalud. El enfoque del trabajo realizado fue crítico propositivo, aplicando la investigación de campo y la revisión bibliográfica, con un nivel de investigación descriptivo en el que se estudió las historias clínicas de 126 pacientes con enfermedad Renal Terminal sometidos a Diálisis peritoneal. OBJETIVOS: Identificar las complicaciones más frecuentes en pacientes en diálisis peritoneal del Hospital III EsSalud – Chimbote, año 2013 - 2017. METODO: Tipo de estudio seleccionado es Descriptivo, RETROSPECTIVO, El método seleccionado es Deductivo. RESULTADOS: El presente estudio revela que las complicaciones más frecuentes en pacientes que se someten a Diálisis Peritoneal en el área de nefrología del Hospital III Essalud – Chimbote en el año 2013 - 2017 son la peritonitis y los desórdenes hidroelectrolíticos que representa el 41% y el 23% respectivamente del total de pacientes cada uno; se encuentra también como complicación la fuga de líquido que representa el 21% y erosión de cuff el 9%. Según la incidencia de las complicaciones más frecuentes en diálisis peritoneal se obtuvo que las complicaciones más frecuentes son: la peritonitis siendo el sexo femenino el de mayor incidencia con el 31% del total de los pacientes, de lo contrario los desórdenes hidroelectrolíticos su mayor incidencia es el sexo masculino con el 12% de todos los pacientes, y además la fuga de líquido el de mayor incidencia en hombres con un 11% y por último la erosión de cuff predominante en el sexo femenino con un 4%.